

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 марта 2026 г. № 23

О перечне основных лекарственных средств

На основании абзаца двадцать второго части третьей [статьи 8](#), части третьей [статьи 37](#)[3] Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХІІ «О здравоохранении», абзаца двадцать шестого части первой [статьи 1](#) Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «Об обращении лекарственных средств» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень основных лекарственных средств согласно [приложению 1](#).
2. Признать утратившими силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь согласно [приложению 2](#).
3. Внести в [постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 апреля 2021 г. № 37](#) «Об утверждении Инструкции о порядке формирования перечня основных лекарственных средств» следующие изменения:

из преамбулы слова «, абзаца шестнадцатого подпункта 8.17 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446,» исключить;

в [Инструкции](#) о порядке формирования перечня основных лекарственных средств, утвержденной этим постановлением:

в части первой [пункта 8](#):

в абзаце третьем слова «приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650 «О вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами» заменить словами «[приложению 1](#) к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 823 «О льготном обеспечении лекарственными средствами и перевязочными материалами»;

в абзаце четвертом слова «приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650» заменить словами «[приложению 1](#) к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 823»;

в [приложении 1](#) к этой Инструкции:

в таблице 1:

в пункте 6:

подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| «6. 4 | H05 Средства, регулирующие обмен кальция»; | | | | |
| | | | | | |

дополнить пункт подпунктом 6.5 следующего содержания:

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|--|--|
| «6. 5 | H04 Гормоны поджелудочной железы»; | | | | |
| | | | | | |

слова «ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 НОЯБРЯ 2007 г. № 1650 «О ВОПРОСАХ БЕСПЛАТНОГО И ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЮ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2025 г. № 823 «О ЛЬГОТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»;

в пункте 15:

подпункты 15.3–15.7 изложить в следующей редакции:

| | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|
| «15. .3 | A05 Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | |
| | | | | | |
| 15. 4 | A06 Слабительные средства | | | | |
| | | | | | |
| 15. 5 | A07 Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника | | | | |
| | | | | | |
| 15. 6 | A09 Средства, нормализующие пищеварение, в том числе ферментные средства | | | | |
| | | | | | |
| 15. 7 | A11 Витамины»; | | | | |
| | | | | | |

дополнить пункт подпунктом 15.8 следующего содержания:

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|
| «15 | A12 Минеральные добавки»; | | | | |
| .8 | | | | | |
| | | | | | |

в таблице 2 слова «ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 НОЯБРЯ 2007 г. № 1650» заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЮ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2025 г. № 823».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

Е.Л.Богдан

СОГЛАСОВАНО

Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь

Комитет государственной безопасности
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
 Республики Беларусь

Министерство обороны
 Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным
 ситуациям Республики Беларусь

Национальная академия наук Беларуси

Управление делами Президента
 Республики Беларусь

Приложение 1
 к постановлению
 Министерства
 здравоохранения
 Республики
 Беларусь
 27.03.2026 № 23

**ПЕРЕЧЕНЬ
 основных лекарственных средств**

Таблица 1

| ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕСПЛАТНОЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--|------------|
| № п/п | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтической-химической классификационной системы | Международное непатентованное наименование лекарственного средства. При отсутствии международного непатентованного | Лекарственная форма, дозировка | Лекарственная форма отечественного производства, дозировка | Примечание |

| | лекарственных средств | о наименования – общепринятое химическое наименование по систематической или заместительной номенклатуре | | | | |
|-----------|---|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | А Пищеварительный тракт и обмен веществ | | | | | |
| 1.1 | A02 Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности | | | | | |
| 1.1.1 | A02A | Соединения, содержащие гидроокись алюминия и магния | Суспензия для внутреннего применения (суспензия для приема внутрь) | Суспензия для внутреннего применения | — | |
| 1 | Антацидные средства | | Таблетки | Таблетки | — | |
| | | | Алюминия фосфат | Суспензия | Суспензия | — |
| 1.1.1.2 | A02B | Ранитидин | Раствор для инъекций (раствор для внутривенного и внутримышечного введения) 25 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл 2 мл | — | |
| 1.1.1.2.1 | Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | | | | Фамотидин |
| | | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг | — |
| | | | | Омепразол | Капсулы 10 мг (капсулы | Капсулы кишечнорастворимые 10 мг |

| | | | | | |
|-------|--|-------------|---|---|---|
| | | | кишечнорастворимые) 10 мг | | |
| | | | Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг | Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг | — |
| | | | Капсулы 40 мг | — | — |
| | | Лансопризол | Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 15 мг | — | — |
| | | | Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 30 мг | Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 30 мг | — |
| 1.2. | A03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | |
| 1.2.1 | A03A Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника | Дротаверин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Таблетки 40 мг | Таблетки 40 мг | — |
| | | | Таблетки 80 мг | — | — |
| | | Папаверин | Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл | Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл | — |
| 1.2.2 | A03B Средства на основе красавки и ее производных | Атропин | Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл | — |
| 1.2.3 | A03F Прокинетики | Домперидон | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---|--|--------------------|
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| | | Метоклопрамид | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| 1.3 | A04 Противорвотные средства и средства для устранения тошноты | | | | |
| 1.3.1 | A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты | Гранисетрон | Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг | — | В детской практике |
| | | | Раствор для инъекций (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 3 мл | — | |
| | | Ондансетрон | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 2 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 2 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 2 мг/мл 4 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 2 мг/мл 4 мл | — |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг | — | |
| | | Трописетрон | Раствор для внутривенного введения (для инъекций) 1 мг/мл 5 мл | Раствор для внутривенного введения (для инъекций) 1 мг/мл 5 мл | — | |
| | | | Капсулы 5 мг | Капсулы 5 мг | — | |
| 1.4 | A05 Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | | |
| 1.4.1 | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей | Урсодезоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | — | |
| | | | Капсулы 300 мг | Капсулы 300 мг | | |
| | | | Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 100 мл | Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 100 мл | — | |
| | | Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 250 мл | Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 250 мл | | | |
| | | Прочие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей (артишока листьев экстракт сухой) | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | | При хронической почечной недостаточности |
| | | | Раствор для приема внутрь 120 мг/мл | Раствор для приема внутрь 120 мг/мл | | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | | |
| Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | |
| 1.4.2 | A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства | Эссенциальные фосфолипиды | Капсулы | Капсулы | – |
| | | Фосфолипиды/глицирризиновая кислота | Капсулы, 65 мг + 35 мг | Капсулы, 65 мг + 35 мг | – |
| | | Орнитина аспартат | Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 3 г | – | – |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 3 г | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 3 г | – |
| 1.5 | A06 Слабительные средства | | | | |
| 1.5.1 | A06A Слабительные средства | Бисакодил | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 5 мг | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 5 мг | – |
| | | Лактулоза | Сироп 500–670 мг/мл 150 мл – 1000 мл, в пакетах 15 мл | Сироп 667–670 мг/мл 150 мл – 500 мл, в пакетах 15 мл | – |
| | | Макрогол | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для | – |

| | | | | | |
|-------|---|------------------------|---|---|---|
| | | | внутреннего применения) 10 г | внутреннего применения) 10 г | |
| | | Макрогол в комбинациях | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения) | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для внутреннего применения) | — |
| 1.6 | A07 Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника | | | | |
| 1.6.1 | A07A Противомикробные средства, действующие на кишечник | Нифуроксазид | Суспензия для внутреннего применения (в детской практике) 44 мг/мл 90 мл | Суспензия для внутреннего применения (в детской практике) 44 мг/мл 90 мл | В детской практике, при хронической почечной и хронической печеночной недостаточности |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | |
| | | | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | |
| | | | Капсулы 200 мг | Капсулы 200 мг | |
| | | Нистатин | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 000 ЕД | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 000 ЕД | — |
| 1.6.2 | A07D Средства, снижающие моторную функцию желудочно-кишечного тракта | Лоперамид | Капсулы 2 мг | Капсулы 2 мг | — |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|--|---|---|
| 1.6. 3 | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник | Месалазин | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг | – | – |
| | | | Таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Суппозитории ректальные 250 мг | Суппозитории ректальные 250 мг | – |
| | | | Суппозитории ректальные 500 мг | Суппозитории ректальные 500 мг | – |
| | | | Суспензия ректальная 4 г/60 мл во флаконах 60 мл | – | – |
| | | Сульфасалазин | Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг) | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | – |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| | | | ой оболочкой), 500 мг | | |
| 1.6.4 | A07F. Антидиарейные микроорганизмы | Антидиарейные микроорганизмы | E. coli – Раствор для внутреннего применения в бутылках или во флаконах 250 мл, 100 мл | E. coli – Раствор для внутреннего применения в бутылках или во флаконах 250 мл, 100 м | В детской практике, при заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью |
| | | | Bifidobacterium bifidum – лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения 5 доз; Lactobacillus acidophilus – порошок лиофилизированный для приготовления раствора для приема внутрь 5 x 10 ⁸ колониеобразующих единиц (5 доз) | Bifidobacterium bifidum – лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения 5 доз; Lactobacillus acidophilus – порошок лиофилизированный для приготовления раствора для приема внутрь 5 x 10 ⁸ колониеобразующих единиц (5 доз) | |
| 1.7 | A09 Средства, нормализующие пищеварение, в том числе ферментные средства | | | | |
| 1.7.1 | A09A Средства, способствующие | Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу | Капсулы кишечнорастворимые 10 000 ЕД | Капсулы кишечнорастворимые 10 000 ЕД | Для лечения кистозного фиброза |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|--|---|
| | пищеварению, включая ферменты | | Капсулы кишечнораствори- мые 25 000 ЕД | – | |
| | | | Капсулы 10 000 ЕД | – | При вращении рака желудка в головку поджелудочной железы; опухолевые поражения желудка и гепатопанкреатоду- денальной зоны с блоком Вирсунгова протока |
| | | | Капсулы 25 000 ЕД | – | |
| 1.8 | A10 Средства для лечения сахарного диабета | | | | |
| 1.8.1 | A10A Инсулины и их аналоги | Инсулин человека (короткого действия) | Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл | Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл | – |
| | | | Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл | Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл | – |
| | | Инсулин человека (актрапид) (короткого действия) | Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл НМ Пенфилл | Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл НМ Пенфилл | – |
| | | Инсулин человека (протафан) (средней продолжительно- сти действия) | Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл | Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл | – |
| | | | Раствор для инъекций 100 | – | – |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | Инсулин человека (генсулин) | МЕ/мл в картриджах 3 мл | | |
| | | Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл | — | — |
| | Инсулин человека (хумулин) | Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл Регуляр | — | — |
| | | Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл НПХ | — | — |
| | Инсулин человека (длительного действия) | Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл | Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл | — |
| | | Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл | Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл | — |
| | Инсулин глизин (короткого действия) | Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Раствор для подкожного введения 100 | — | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | ЕД/мл в картриджах 3 мл | | |
| | Инсулин аспарт | Суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Раствор для подкожного и 100 ЕД/мл в картридже 3 мл, установленном в пластиковую шприц-ручку | – | – |
| | Инсулин гларгин (длительного действия) | Раствор для инъекций в картриджах 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл | Раствор для инъекций в картриджах 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл | Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл | |
| | | Раствор для подкожного введения 300 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 1,5 мл | – | – |
| | Инсулин детемир (длительного действия) | Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках 3 мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|--|--|---|
| | | Инсулин лиспро | Раствор для внутривенного и подкожного введения, 100 МЕ/мл | — | — |
| 1.8. 2 | A10B Пероральные гипогликемизирующие средства | Метформин | Таблетки 500 мг | Таблетки 500 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | — |
| | | | Таблетки с модифицированным (пролонгированным) высвобождением 500 мг | Таблетки с модифицированным (пролонгированным) высвобождением 500 мг | — |
| | | | Таблетки с модифицированным (пролонгированным) высвобождением 750 мг | Таблетки с модифицированным (пролонгированным) высвобождением 750 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг | — |
| | | | Таблетки с модифицированным (пролонгированным) | Таблетки с модифицированным (пролонгированным) | — |
| | | | Таблетки с модифицированным (пролонгированным) | Таблетки с модифицированным (пролонгированным) | — |

| | | | | |
|--|----------------------------|---|---|---|
| | | высвобождением 1000 мг | высвобождени ем 1000 мг | |
| | Глибенкламид | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | Гликлазид | Таблетки 80 мг | Таблетки 80 мг | — |
| | | Таблетки 30 мг с модифицированны м высвобождением | Таблетки 30 мг с модифициров анным высвобождени ем | — |
| | | Таблетки 60 мг с модифицированны м высвобождением | Таблетки 60 мг с модифициров анным высвобождени ем | — |
| | Гликвидон | Таблетки 30 мг | Таблетки 30 мг | — |
| | Метформин/Глиб енкламид | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/2,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/2,5 мг | — |
| | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 500 мг/5 мг | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 500 мг/5 мг | — |
| | Вилдаглиптин | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | Капсулы 50 мг | Капсулы 50 мг | — |
| | Дапаглифлозин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — | При хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек. Назначается на |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------|---|--|---|
| | | | | | основании заключения врачебного консилиума |
| | | Эмпаглифлозин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | При хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | |
| 1.9 | A11 Витамины | | | | |
| 1.9.1 | A11C Витамины А и D и их комбинации | Холекальциферол | Капли (раствор для приема внутрь масляный) 0,5 мг/мл (20 000 МЕ/мл) 10 мл | Раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл | В детской практике |
| | | | Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл | Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл | |
| | | | Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл, 15 мл, 20 мл | Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл, 15 мл, 20 мл | |
| | | Кальцитриол | Капсулы 0,25 мкг | – | При гипопаратиреозе |
| | | | Раствор для приема внутрь масляный 1 мкг/мл | Раствор для приема внутрь масляный 1 мкг/мл | |

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | Ретинол (витамин А) | Раствор масляный для внутреннего применения 34,4 мг/мл 10 мл | – | При ихтиозе (Q80–Q80.4, Q80.8) |
| | | | Капсулы 5000 МЕ | Капсулы 5000 МЕ | – |
| 1.9. | A11H Прочие 2 витамины (исключая комбинации) | Токоферол | Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 50 мг/мл 20 мл | – | – |
| | | | Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 100 мг/мл 20 мл | – | – |
| | | | Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 300 мг/мл 20 мл | – | – |
| 1.10 | A12 Минеральные добавки | | | | |
| 1.10 | A12A Средства .1 на основе кальция | Кальций/Холека льциферол | Капсулы 66,7 МЕ/166,7 мг | Капсулы 66,7 МЕ/166,7 мг | – |
| | | | Капсулы 133,4 МЕ/166,7 мг | Капсулы 133,4 МЕ/166,7 мг | – |
| | | | Таблетки жевательные, 500 мг/200 МЕ | Таблетки жевательные, 500 мг/200 МЕ | – |
| 1.10 | A12C Прочие .2 минеральные добавки | Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния | Таблетки 175 мг/175 мг | – | В детской практике |
| | | | Таблетки, покрытые | Таблетки, покрытые | В детской практике |

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|--------------------|
| | | | оболочкой, 140 мг/158 мг | оболочкой, 140 мг/158 мг | |
| | | Цинка сульфат | Таблетки, покрытые оболочкой, 124 мг | — | — |
| 1.11 | A16 Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ | | | | |
| 1.11 | A16A Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ | Тавамин (валин/изолейцин/лейцин/таурин) | Капсулы | Капсулы | — |
| .1 | | Адеметионин | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг | При циррозе печени |
| | | Тиоктовая кислота | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | — |
| | | | Раствор для внутривенного введения 25 мг/мл 24 мл | Раствор для внутривенного введения 25 мг/мл 24 мл | — |
| | | | Раствор для для внутривенного введения 12 мг/мл 50 мл | Раствор для для внутривенного введения 12 мг/мл 50 мл | — |
| 2 | B Кровь и кроветворные органы | | | | |
| 2.1 | B01 Антитромботические средства | | | | |
| 2.1. | B01A Антитромботические средства | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2.1. | B01AA | Варфарин | Таблетки 2,5 мг | Таблетки 2,5 мг | — |
| 1.1 | Антагонисты витамина К | | | мг | |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|---|
| 2.1. В01АВ 1.2 Прямые антикоагулянты на основе гепарина и его производных | Гепарин | Раствор для внутривенного и подкожного введения (для инъекций) 5000 МЕ/мл 5 мл | Раствор для внутривенного и подкожного введения (для инъекций) 5000 МЕ/мл 5 мл | — |
| | Дальтепарин | Раствор для инъекций 2500 МЕ анти-Ха/0,2 мл | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Раствор для инъекций 5000 МЕ анти-Ха/0,2 мл | — | |
| | | Раствор для инъекций 10 000 МЕ анти-Ха/1 мл | — | |
| | Эноксапарин | Раствор для инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл | Раствор для инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2 мл | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл | Раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл | |
| | | Раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл | Раствор для инъекций 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл | |
| | | Раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл | Раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл | |
| | Надропарин | Раствор для подкожного введения 2850 МЕ анти-Ха/0,3 мл | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|--|--|---|
| | | | Раствор для подкожного введения 3800 МЕ анти-Ха/0,4 мл | — | |
| | | | Раствор для подкожного введения 5700 МЕ анти-Ха/0,6 мл | — | |
| | | | Раствор для подкожного введения 7600 МЕ анти-Ха/0,8 мл | — | |
| 2.1. 1.3 | B01AC Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключая гепарин | Дипиридамо́л | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 25 мг | — | |
| | | Клопидогрел | Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг | — |
| | | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой), 75 мг | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой), 75 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг | — |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|---|---|---|
| | | | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой), 150 мг | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой), 150 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | — |
| | | Тикагрелор | Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 90 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 90 мг | |
| 2.1. 1.4 | B01AE Прямые ингибиторы тромбина | Дабигатрана этексилат | Капсулы 75 мг | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Капсулы 110 мг | — | |
| | | | Капсулы 150 мг | — | |
| 2.1. 1.5 | B01AF Прямые ингибиторы фактора Ха | Ривароксабан | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Назначается на основании заключения |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг | врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | |
| | | Апиксабан | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | |
| 2.2 | B02 Гемостатические средства | | | | |
| 2.2.1 | B02B Витамин К и другие гемостатики | Коагуляционный фактор VIII | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 250 МЕ | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 500 МЕ | – | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 1000 МЕ | — | |
| | Фактор Виллебранда и коагуляционный фактор VIII в комбинации | | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ фактора VIII /500 МЕ фактора Виллебранда | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ фактора VIII/1000 МЕ фактора Виллебранда | — | |
| | Коагуляционный фактор IX | | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного введения, для инфузий (для инъекций) 250 МЕ | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для | — | |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|-------------------------------------|
| | | приготовления раствора для инфузий (для инъекций) (раствора для внутривенного введения) 500 МЕ | | |
| | | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) (для внутривенного введения) 1000 МЕ | — | |
| | Фибриноген | Набор для приготовления гемостатического геля для местного применения в комплекте с набором для растворения и нанесения геля (состав: фибриноген, тромбин, кальция хлорид) | Набор для приготовления гемостатического геля для местного применения в комплекте с набором для растворения и нанесения геля | — |
| | Этамзилат | Раствор для инъекций 125 мг/мл 2 мл | Раствор для инъекций 125 мг/мл 2 мл | — |
| | | Таблетки 250 мг | Таблетки 250 мг | — |
| | Элтромбопаг | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | — | Назначается на основании заключения |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | – | врачебного консилиума |
| | | Эмицизумаб | Раствор для подкожного введения 30 мг/мл | – | При ингибиторной форме гемофилии А и тяжелой неингибиторной форме гемофилии А Назначается на основании заключения врачебного консилиума с участием главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения по гемостазиопатиям и главного внештатного гематолога Министерства здравоохранения (для детского населения – главного внештатного детского онколога-гематолога Министерства здравоохранения) |
| | | | Раствор для подкожного введения 60 мг/0,4 мл | – | |
| | | | Раствор для подкожного введения 105 мг/0,7 мл | – | |
| | | | Раствор для подкожного введения 150 мг/мл | – | |
| 2.3 | В03 Противоанемические средства | | | | |
| 2.3.1 | В03А Средства на основе железа | Железа глюконат | Таблетки, покрытые оболочкой, 35 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 35 мг | – |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|---|---|
| | | Железа сульфат/Аскорбиновая кислота | Таблетки, покрытые оболочкой, 320 мг/60 мг | — | — |
| | | Железа оксид декстран комплекс | Раствор для внутримышечного введения; раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл | Раствор для внутримышечного введения | — |
| | | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс | Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл | Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Капли для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл | Капли для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл | В детской практике |
| | | | Сироп 10 мг/мл | Сироп 10 мг/мл | |
| | | | Таблетки жевательные 100 мг | Таблетки жевательные 100 мг | — |
| 2.3.2 | В03В Витамин В12 и фолиевая кислота | Цианокобаламин | Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл | — |
| | | Фолиевая кислота | Таблетки 1 мг | Таблетки 1 мг | — |
| 2.3.3 | В03Х Прочие противонаемические средства | Эритропоэтин | Раствор для инъекций 4000 МЕ/мл 1 мл | Раствор для инъекций 4000 МЕ/мл 1 мл | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Раствор для инъекций 10 000 МЕ/мл 1 мл | Раствор для инъекций 10 000 МЕ/мл 1 мл | |

| | | | | | |
|---------|--|---------|--|--|---|
| | | | Раствор для внутривенного и подкожного введения (для инъекций) 2000 МЕ/мл 1 мл | Раствор для инъекций 2000 МЕ/мл 1 мл | |
| | | | Раствор для внутривенного и подкожного введения 40 000 МЕ/1 мл | — | |
| 2.4 | B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы | | | | |
| 2.4.1 | B05B Растворы для внутривенного введения | | | | |
| 2.4.1.1 | B05BA Растворы для парентерального питания | Глюкоза | Раствор для инфузий 50 мг/мл | Раствор для инфузий 50 мг/мл | — |
| | | | Раствор для инфузий 100 мг/мл | Раствор для инфузий 100 мг/мл | — |
| | | | Раствор для инфузий 75 мг/мл | Раствор для инфузий 75 мг/мл | — |
| | | | Раствор для инфузий 200 мг/мл | Раствор для инфузий 200 мг/мл | — |
| | | | Раствор для инфузий (для внутривенного введения) 400 мг/мл | Раствор для инфузий (для внутривенного введения) 400 мг/мл | — |
| | | | Порошок (фармацевтическая субстанция для приготовления порошка) | — | — |

| | | | | | |
|------|--|---|--|--|---|
| | | Жировая эмульсия для парентерального питания | Эмульсия для инфузий 10 % 100 мл, 500 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 20 % 100 мл, 250 мл, 500 мл | — | — |
| | | Жировая эмульсия в составе комбинированных препаратов | Эмульсия для инфузий 493 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 986 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 1026 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 1440 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 1477 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 1540 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 1920 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 2400 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 2053 мл | — | — |
| | | | Эмульсия для инфузий 2566 мл | — | — |
| | | Аминокислоты для парентерального питания | Раствор для инфузий 10 % 100 мл | — | — |
| 2.4. | В05ВВ | Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния | Раствор для инфузий 250 мл, 500 мл, 400 мл | Раствор для инфузий 250 мл, 500 мл, 400 мл | — |
| 1.2 | Растворы, влияющие на электролитный баланс | | | | |

| | | | | о введения 5 мл | |
|-----------|---|-------------|---|--------------------|---|
| 2.4. 2 | B05D Растворы для перитонеально го диализа | Электролиты | Раствор для перитонеального диализа 1,36–1,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 1,36–1,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,5 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 1,5 % глюкозы/ 1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–5,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,5 л | – | – |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | Раствор для перитонеального диализа 2,3 % глюкозы/ 1,25–1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–5,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 3,86–4,25 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 4,25 % глюкозы/ 1,25–1,75 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–5,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 1,36–1,5 % глюкозы/ 1,25–1,38 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,25–1,38 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5–2,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 1,36–1,5 % | – | – |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л | | |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 1,36–1,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0–7,4–2,5 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0–7,4–2,5 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 3,86–4,25 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0–7,4–2,0 л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 1,36–1,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 34 | – | – |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | ммоль/л HCO_3^- / $\text{pH} \approx 7,0-7,4-2,0$ л | | |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 1,5 % глюкозы/ 1,25–1,75 ммоль/л Ca^{++} / 34 ммоль/л HCO_3^- / $\text{pH} \approx 7,4-3,0$ л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 2,27–2,5 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Ca^{++} / 34 ммоль/л HCO_3^- / $\text{pH} \approx 7,0-7,4-2,0$ л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 2,3 % глюкозы/ 1,25–1,75 ммоль/л Ca^{++} / 34 ммоль/л HCO_3^- / $\text{pH} \approx 7,4-3,0$ л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 3,86–4,25 % глюкозы/ 1,7–1,8 ммоль/л Ca^{++} / 34 ммоль/л HCO_3^- / $\text{pH} \approx 7,0-7,4-2,0$ л | – | – |
| | | | Раствор для перитонеального диализа 4,25 % глюкозы/ 1,25–1,75 ммоль/л Ca^{++} / 34 ммоль/л HCO_3^- / $\text{pH} \approx 7,4-3,0$ л | – | – |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|
| 2.4. 3 | B05X Добавки к растворам для внутривенного введения | Натрия гидрокарбонат | Раствор для инфузий 40 мг/мл 100 мл, 300 мл | Раствор для инфузий 40 мг/мл 100 мл, 300 мл | — |
| | | | Раствор для инфузий 84 мг/мл 100 мл | Раствор для инфузий 84 мг/мл 100 мл | — |
| | | Натрия хлорид | Раствор для инфузий (для инъекций) 9 мг/мл | Раствор для инфузий (для инъекций) 9 мг/мл | — |
| | | | Раствор для инфузий 100 мг/мл | Раствор для инфузий 100 мг/мл | — |
| | | Витамины (поливитамины для парентерального введения) | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, лиофильно высушенный спрессованный порошок | — | — |
| | | Витамин А, витамин D2, витамин Е, витамин К1. Поливитамины – комплекс жирорастворимых витаминов (парентеральное введение) (Виталипид Н детский) | Концентрат для приготовления эмульсии для инфузий (состав 1 ампулы: витамин А 690 мкг (2300 МЕ), витамин D2 10 мкг (400 МЕ), витамин Е 6,4 мг (7 МЕ), витамин К1 200 мкг) | — | — |
| 2.4. 4 | B05XA Растворы электролитов | Электролиты в комбинации | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мл | — | — |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|---|---|---|
| 2.5 | B06 Другие гематологические средства | | | | |
| 2.5.1 | B06A Прочие гематологические средства | Гиалуронидаза | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 МЕ | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 МЕ | — |
| 2.5.2 | B06AC Лекарственные средства для лечения наследственного ангионевротического отека | C1-ингибитор (человеческий) | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ | — | При наследственном ангионевротическом отеке Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 3 | C Сердечно-сосудистая система | | | | |
| 3.1 | C01 Средства для лечения заболеваний сердца | | | | |
| 3.1.1 | C01A Сердечные гликозиды | Дигоксин | Таблетки 0,25 мг Для инъекций 0,25 мг/мл 1 мл | Таблетки 0,25 мг — | — — |
| 3.1.2 | C01B Антиаритмические средства, классы I и III | Прокаинамид | Раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 5 мл | Раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 5 мл | — |
| | | Пропафенон | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | — |
| | | Амиодарон | Раствор для (внутривенных) | — | — |

| | | | | | |
|------|--|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | инъекций 50 мг/мл 3 мл | | |
| | | | Таблетки 200 мг | Таблетки 200 мг | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл | — |
| | | Этацизин | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | — | — |
| 3.1. | C01D | Глицерил тринитрат | Таблетки подъязычные 0,5 мг | Таблетки подъязычные 0,5 мг | — |
| 3 | Периферические вазодилаторы, используемые при лечении заболеваний сердца | Изосорбид мононитрат | Капсулы 20 мг | Капсулы 20 мг | — |
| | | | Капсулы 40 мг | Капсулы 40 мг | — |
| | | Молсидомин | Таблетки 2 мг | Таблетки 2 мг | — |
| | | | Таблетки 4 мг | Таблетки 4 мг | — |
| | | Нитаргал | Таблетки 40 мг | Таблетки 40 мг | — |
| 3.1. | C01E | Ивабрадин | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — |
| 4 | Прочие средства для лечения заболеваний сердца | Ивабрадин | Таблетки, покрытые оболочкой, 7,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 7,5 мг | — |
| | | | Триметазидин | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг |
| | | | Таблетки с модифицированным | Таблетки с модифицированным | — |

| | | | | | |
|-------|---|------------|---|---|--|
| | | | (пролонгированным) высвобождением, покрытые оболочкой, 35 мг | (пролонгированным) высвобождением, покрытые оболочкой, 35 мг | |
| 3.2 | C02 Антигипертензивные средства | | | | |
| 3.2.1 | C02A Средства центрального действия, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической иннервации | Клонидин | Таблетки 0,15 мг | Таблетки 0,15 мг | – |
| | | Моксонидин | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,3 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,3 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг | – |
| 3.2.2 | C02K Прочие антигипертензивные средства | Бозентан | Таблетки, покрытые оболочкой, 62,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 62,5 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг | |
| | | Риоцигуат | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг | – | При легочной гипертензии (неоперабельная или персистирующая/ рецидивирующая) |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг | – | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------------|---|---|---|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 1,5 мг | – | хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия) Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | – | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | – | |
| 3.3 | C03 Мочегонные средства | | | | |
| 3.3.1 | C03A Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды | Гидрохлортиазид | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | – |
| | | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | – |
| 3.3.2 | C03B Мочегонные средства с низким потолком дозы, исключая тиазиды | Индапамид | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1,5 мг | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1,5 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | – |
| | | | Капсулы 2,5 мг | – | – |
| 3.3.3 | C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики) | Фуросемид | Таблетки 40 мг | Таблетки 40 мг | – |
| | | | Раствор для инъекций (раствор для внутривенного и внутримышечного введения) 10 мг/мл 2 мл | Раствор для инъекций (раствор для внутривенного и внутримышечного | – |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | введения) 10 мг/мл 2 мл | |
| | | Торасемид | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | |
| | | | Таблетки 20 мг | Таблетки 20 мг | |
| 3.3. 4 | C03D Калийсберегающие диуретики | Спиронолактон | Капсулы 25 мг | Капсулы 25 мг | — |
| | | | Капсулы 50 мг | Капсулы 50 мг | — |
| | | | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | — |
| | | | Таблетки (покрытые оболочкой) 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | | Таблетки (покрытые оболочкой) 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| 3.4 | C04 Периферические вазодилататоры | | | | |
| 3.4. 1 | C04A Периферические вазодилататоры | Ксантинола никотинат | Раствор для инъекций 150 мг/мл 2 мл | Раствор для инъекций 150 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Таблетки 150 мг | — | — |
| | | Пентоксифиллин | Раствор для инфузий 0,8 мг/мл 100 мл | Раствор для инфузий 0,8 мг/мл 100 мл | — |
| | | | Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл | Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл | — |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------|---|---|---|
| | | | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг | — |
| | | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 400 мг | — | — |
| | | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 600 мг | — | — |
| | | Ницерголин | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг | — |
| | | | Капсулы 5 мг | Капсулы 5 мг | — |
| | | | Капсулы 10 мг | Капсулы 10 мг | — |
| | | | Капсулы 30 мг | Капсулы 30 мг | — |
| 3.5 | C05 Ангиопротекторы | | | | |
| 3.5.1 | C05B Средства, применяемые при | Гепарин | Гель для наружного применения 100 МЕ/г | Гель для наружного применения 100 МЕ/г | — |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------------|---|---|---|
| | варикозном расширении вен | | Гель для наружного применения 300 МЕ/г | Гель для наружного применения 300 МЕ/г | — |
| | | | Гель для наружного применения 600 МЕ/г | Гель для наружного применения 600 МЕ/г | — |
| | | | Гель для наружного применения 1000 МЕ/г | Гель для наружного применения 1000 МЕ/г | — |
| | | Гепарин комбинированный | Мазь для наружного применения | Мазь для наружного применения | — |
| 3.5.2 | С05С Средства, снижающие проницаемость капилляров (ангиопротекторы) | Троксерутин | Капсулы 200 мг | Капсулы 200 мг | — |
| | | | Капсулы 300 мг | Капсулы 300 мг | — |
| 3.6 | С07 Бета-адреноблокаторы | | | | |
| 3.6.1 | С07А Бета-адреноблокаторы | Пропранолол | Таблетки 10 мг | — | — |
| | | | Таблетки 40 мг | Таблетки 40 мг | — |
| | | Соталол | Таблетки 80 мг | Таблетки 80 мг | — |
| | | | Таблетки 160 мг | Таблетки 160 мг | — |
| | | Атенолол | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | Бисопролол | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | Таблетки, покрытые | — |

| | | | | | |
|--|--|------------|---|--|---|
| | | | | оболочкой, 2,5 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | Метопролол | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | | Таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, 50 мг | — | — |
| | | | Таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, 100 мг | — | — |
| | | | Капсулы с пролонгированным высвобождением 100 мг | Капсулы с пролонгированным высвобождением 100 мг | — |
| | | | Капсулы с пролонгированным высвобождением 50 мг | Капсулы с пролонгированным высвобождением 50 мг | — |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | | Карведилол | Таблетки 6,25 мг | Таблетки 6,25 мг | — |
| | | | Таблетки 12,5 мг | Таблетки 12,5 мг | — |
| | | | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| | | | Капсулы 6,25 мг | Капсулы 6,25 мг | — |
| | | | Капсулы 12,5 мг | Капсулы 12,5 мг | — |
| | | | Капсулы 25 мг | Капсулы 25 мг | — |
| | | Небиволол | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| 3.6. 2 | C07F Бета-адреноблокаторы в комбинации с другими средствами | Бисопролол/Амлодипин | Таблетки 5 мг/5 мг | Таблетки 5 мг/5 мг | — |
| | | | Таблетки 5 мг/10 мг | Таблетки 5 мг/10 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг/5 мг | Таблетки 10 мг/5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг/10 мг | Таблетки 10 мг/10 мг | — |
| 3.7 | C08 Блокаторы кальциевых каналов | | | | |
| 3.7. 1 | C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды | Амлодипин | Таблетки 2,5 мг | — | — |
| | | | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| | | Нимодипин | Раствор для инфузий 0,2 мг/мл 50 мл | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг | — | — |
| | | Нифедипин | Таблетки 10 мг | — | — |
| Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — | | — | | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|---|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | — | — |
| | | | Таблетки с замедленным высвобождением (пролонгированного действия), покрытые оболочкой, 20 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, с контролируемым высвобождением 30 мг | — | — |
| | | Лерканидипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| 3.7. | C08D | Верапамил | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг | — |
| 2 | Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце | Дилтиазем | Таблетки 60 мг | Таблетки 60 мг | — |
| | | | Таблетки ретард, покрытые оболочкой, 90 мг | — | — |
| | | | Таблетки ретард, покрытые оболочкой, 180 мг | — | — |
| | | | Капсулы пролонгированного действия 180 мг | Капсулы пролонгированного действия 180 мг | — |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 3.8 | C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему | | | | | | |
| 3.8. 1 | C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента | Каптоприл | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — | | |
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — | | |
| | | Эналаприл | Таблетки 2,5 мг | — | — | | |
| | | | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — | | |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — | | |
| | | | Таблетки 20 мг | Таблетки 20 мг | — | | |
| | | Лизиноприл | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — | | |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — | | |
| | | | Таблетки 20 мг | Таблетки 20 мг | — | | |
| | | Периндоприл | Таблетки 4 мг (таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг) | — | — | | |
| | | | Таблетки 8 мг (таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг) | — | — | | |
| | | | Капсулы 2 мг | Капсулы 2 мг | — | | |
| | | | Капсулы 4 мг | Капсулы 4 мг | — | | |
| | | | Капсулы 8 мг | Капсулы 8 мг | — | | |
| | | | Рамиприл | Таблетки 1,25 мг | Таблетки 1,25 мг | — | |
| | | Таблетки 2,5 мг | | Таблетки 2,5 мг | — | | |
| | | Таблетки 5 мг | | Таблетки 5 мг | — | | |
| | | Таблетки 10 мг | | Таблетки 10 мг | — | | |
| | | 3.8. 2 | C09B Ингибиторы | Эналаприл/Гидрохлортиазид | Таблетки 10 мг/12,5 мг | Таблетки 10 мг/12,5 мг | — |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------|--------------------|---|
| ангиотензинпревращающего фермента в комбинации с другими средствами | | Таблетки 10 мг/25 мг | Таблетки 10 мг/25 мг | — | |
| | | Таблетки 20 мг/12,5 мг | Таблетки 20 мг/12,5 мг | — | |
| | Лизиноприл/Гидрохлортиазид | Таблетки 10 мг/12,5 мг | Таблетки 10 мг/12,5 мг | — | |
| | | Таблетки 20 мг/12,5 мг | Таблетки 20 мг/12,5 мг | — | |
| | Периндоприл/Индапамид | Таблетки 2 мг/0,625 мг (таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг/0,625 мг) | — | — | |
| | | Таблетки 4 мг/1,25 мг (таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг/1,25 мг) | — | — | |
| | | Таблетки 8 мг/2,5 мг (таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг/2,5 мг) | — | — | |
| | | Капсулы 2 мг/0,625 мг | Капсулы 2 мг/0,625 мг | — | |
| | | Капсулы 4 мг/1,25 мг | Капсулы 4 мг/1,25 мг | — | |
| | | Капсулы 8 мг/2,5 мг | Капсулы 8 мг/2,5 мг | — | |
| | | Периндоприл/амлодипин | Капсулы 4 мг/5 мг | Капсулы 4 мг/5 мг | — |
| | | | Капсулы 4 мг/10 мг | Капсулы 4 мг/10 мг | — |
| | Капсулы 8 мг/5 мг | | Капсулы 8 мг/5 мг | — | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Капсулы 8 мг/10 мг | Капсулы 8 мг/10 мг | — |
| | | Рамиприл/Гидрохлортиазид | Таблетки 2,5 мг/12,5 мг | Таблетки 2,5 мг/12,5 мг | — |
| | | | Таблетки 5 мг/25 мг | Таблетки 5 мг/25 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг/12,5 мг | Таблетки 10 мг/12,5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг/25 мг | Таблетки 10 мг/25 мг | — |
| | | | Лизиноприл/Амлодипин | Капсулы 10 мг/5 мг | Капсулы 10 мг/5 мг |
| | | | Таблетки 10 мг/5 мг | Таблетки 10 мг/5 мг | — |
| | | | Таблетки 20 мг/10 мг | — | — |
| 3.8. 3 | C09C Антагонисты ангиотензина II | Валсартан | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг | — |
| | | Лозартан | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | — |
| | | Кандесартан | Таблетки 8 мг | Таблетки 8 мг | — |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|---|---|---|
| | | | Таблетки 16 мг | Таблетки 16 мг | — |
| | | | Таблетки 32 мг | Таблетки 32 мг | — |
| | | Ирбесартан | Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | — |
| | | Телмисартан | Таблетки 40 мг | Таблетки 40 мг | — |
| | | | Таблетки 80 мг | Таблетки 80 мг | — |
| | | Олмесартана медоксомил | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг | — |
| 3.8. 4 | C09D Антагонисты ангиотензина II в комбинации с | Лозартан/Гидрохлортазид | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг/12,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг/12,5 мг | — |

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|--|--|---|
| другими средствами | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/12,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/12,5 мг | — |
| | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг | — |
| | Валсартан/Гидрохлортиазид | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/12,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/12,5 мг | — |
| | | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/25 мг | — |
| | | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/12,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/12,5 мг | — |
| | Ирбесартан/Гидрохлоротитазид | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 12,5 мг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 12,5 мг | — |
| | | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 12,5 мг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 12,5 мг | |
| | | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 25 мг | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 25 мг | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|--|--|---|
| | | Валсартан/Амлодипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/10 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/5 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/5 мг | — | — |
| | | Валсартан/Сакубитрил | Таблетки, покрытые оболочкой, 25,7 мг + 24,3 мг | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 51,4 мг + 48,6 мг | — | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 102,8 мг + 97,2 мг | — | |
| 3.9 | С10 Гиполипидемические средства | | | | |
| 3.9.1 | С10А Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства | Аторвастатин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг | — |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--|--|----------------------|
| | | Розувастатин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | — |
| | | Фенофибрат | Таблетки, покрытые оболочкой, 145 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 145 мг | При сахарном диабете |
| 4 | D Дерматологические средства | | | | |
| 4.1 | D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи | | | | |
| 4.1.1 | D01A 1 Противогрибковые средства для местного применения | Нистатин | Мазь для наружного применения 100 000 МЕ/г | Мазь для наружного применения 100 000 МЕ/г | — |
| | | Миконазол | Крем для наружного применения 20 мг/г | Крем для наружного применения 20 мг/г | — |
| | | Клотримазол | Раствор для наружного применения 10 мг/мл | Раствор для наружного применения 10 мг/мл | — |
| | | | Крем (для наружного применения) 10 мг/г | — | — |
| | | Тербинафин | Гель для наружного применения 10 мг/г | — | — |
| | | | Крем (крем для наружного | Крем для наружного | — |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|---|
| | | | применения) 10 мг/г | применения 10 мг/г | |
| | | | Раствор для наружного применения 10 мг/мл 25 мл, 30 мл | Раствор для наружного применения 10 мг/мл 25 мл, 30 мл | — |
| 4.1. | D01B 2 Противогрибковые средства для системного применения | Тербинафин | Таблетки 250 мг | Таблетки 250 мг | — |
| 4.2 | D02 Средства со смягчающим и протекторным действием | | | | |
| 4.2. | D02A 1 Смягчающие и защитные средства. Средства на основе цинка | Цинка оксид | Мазь для наружного применения 100 мг/г | Мазь для наружного применения 100 мг/г | При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4 |
| 4.3 | D03 Средства для лечения ран и язв | | | | |
| 4.3. | D03A 1 Ранозаживляющие средства | Метилурацил | Мазь для наружного применения 100 мг/г | Мазь для наружного применения 100 мг/г | — |
| Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови | | Гель для наружного применения | Гель для наружного применения | При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4 | |
| Декспантенол | | Крем для наружного применения | Крем для наружного применения | При ихтиозе Q80–Q80.4, Q80.8 | |
| 4.4 | D06 Противомикробные средства для лечения заболеваний кожи | | | | |
| 4.4. | D06A 1 Антибиотики | Хлорамфеникол | Линимент для наружного | Линимент для наружного | — |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------------|--|--|---|
| | для местного применения | | применения 50 мг/г | применения 50 мг/г | |
| | | | Линимент для наружного применения 100 мг/г | Линимент для наружного применения 100 мг/г | — |
| | | Гентамицин | Мазь для наружного применения 1 мг/г | Мазь для наружного применения 1 мг/г | — |
| 4.4. | D06B 2 Химиотерапевтические средства для наружного применения | Сульфадиазин серебра | Крем (мазь) для наружного применения 10 мг/г | Крем для наружного применения 10 мг/г | При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80–Q80.4 |
| | | Ацикловир | Мазь для наружного применения 25 мг/г | Мазь для наружного применения 25 мг/г | — |
| | | | Мазь для наружного применения 50 мг/г | Мазь для наружного применения 50 мг/г | — |
| 4.4. | D06C 3 Антибиотики в комбинации с прочими противомикробными средствами | Хлорамфеникол/ Метилурацил | Мазь для наружного применения (7,5 мг + 40 мг)/1 г | Мазь для наружного применения (7,5 мг + 40 мг)/1 г | — |
| 4.5 | D07 Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи | | | | |
| 4.5. | D07A 1 Кортикостероиды | Флуоцинолон | Мазь для наружного применения 0,25 мг/г | Мазь для наружного применения 0,25 мг/г | — |
| | | Бетаметазон | Мазь (для наружного применения) 1 мг/г | Мазь для наружного применения | — |

| | | | | | |
|------|--|-------------------------------|--|--|---|
| | | | | применения 1 мг/г | |
| | | | Мазь для наружного применения 0,5 мг/г | – | – |
| | | | Крем для наружного применения 0,5 мг/г | – | – |
| | | | Крем 1 мг/г | – | – |
| | | | Суспензия для инъекций 5 мг + 2 мг/1 мл | Суспензия для инъекций 5 мг + 2 мг/1 мл | – |
| | | Гидрокортизон | Мазь для наружного применения 10 мг/г | Мазь для наружного применения 10 мг/г | – |
| | | Преднизолон | Мазь для наружного применения 5 мг/г | Мазь для наружного применения 5 мг/г | – |
| | | Триамцинолон | Мазь 1 мг/г | – | – |
| 4.5. | D07C | Гидрокортизон/Окситетрациклин | Аэрозоль для применения на кожу, суспензия, (3,1 мг + 9,3 мг)/г в баллонах 32,25 г | – | При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2– Q80.4 |
| 2 | Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками | | Мазь (мазь для местного и наружного применения) (10 мг + 30 мг)/г | – | |
| | | Бетаметазон/Гентамицин | Мазь для наружного | Мазь для наружного применения | – |

| | | | | | |
|------|---|--------------|---|---|---|
| | | | применения (0,5 мг + 1000 МЕ)/г | (0,5 мг + 1000 МЕ)/г | |
| | | | Крем (0,5 мг + 1 мг)/г | – | – |
| 4.6 | D08 Антисептические и дезинфицирующие средства | | | | |
| 4.6. | D08A Антисептические и дезинфицирующие средства | | | | |
| 1 | | | | | |
| 4.6. | D08AC | Хлоргексидин | Раствор для наружного (местного) применения 0,5 мг/мл | Раствор для наружного (местного) применения 0,5 мг/мл | – |
| 1.1 | Бигуаниды и амидины | | Декспантенол/Хлоргексидин | Крем (для наружного применения) (50 мг + 5 мг)/г | Крем для наружного применения (50 мг + 5 мг)/г |
| 4.6. | D08AG | Повидон йод | Мазь для наружного применения 10 мг/г | Мазь для наружного применения 100 мг/г | При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4 |
| 1.2 | Йодсодержащие средства | | Раствор для наружного применения 100 мг/мл 30 мл-1000 мл | Раствор для наружного применения 100 мг/мл 100 мл – 1000 мл | |
| | | | Раствор для наружного применения 5 мг (активного йода)/мл | Раствор для наружного применения 5 мг (активного йода)/мл | |
| 4.6. | D08AX | Этанол | Раствор для наружного применения 70 % | Раствор для наружного применения 70 % | – |
| 1.3 | Другие антисептические и дезинфицирующие средства | | | | |
| 5 | G Мочеполовая система и половые гормоны | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|--|---------------------------------|---|
| 5.1 | G01 Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии | | | | |
| 5.1.1 | G01A 1 Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами | Фуразолидон | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | Миконазол | Суппозитории вагинальные 100 мг | Суппозитории вагинальные 100 мг | — |
| 5.2 | G02 Другие средства для лечения гинекологических заболеваний | | | | |
| 5.2.1 | G02C Прочие средства, применяемые в гинекологии. G02CB Ингибиторы секреции пролактина | Бромокриптин | Таблетки 2,5 мг | — | — |
| | | Каберголин | Таблетки 0,5 мг | Таблетки 0,5 мг | — |
| 5.3 | G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы | | | | |
| 5.3.1 | G03A 1 Гормональные контрацептивы для системного применения. G03AC Прогестагены | Медроксипрогестерон | Таблетки 500 мг | — | — |
| 5.3.2 | G03B 2 Андрогены | Тестостерон | Раствор для внутримышечного введения 250 мг/мл 1 мл, 4 мл | — | При гипопитуитаризме; синдроме Клайнфелтера, кариотип 47, ХХУ |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|---------------|--|
| 5.3. 3 | G03C Эстрогены | Эстрадиол | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | — | — |
| 5.3. 4 | G03D Прогестагены | Прогестерон | Капсулы 100 мг | — | — |
| | | | Капсулы 200 мг | — | — |
| | | Дидрогестерон | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — | — |
| 5.3. 5 | G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | Гонадотропин хорионический | Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного (и подкожного) введения 1500 МЕ | — | — |
| | | | Лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутримышечного (и подкожного) введения (для инъекций) 5000 МЕ | — | — |
| 5.3. 6 | G03H Антиандрогены | Ципротерон | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций) 100 мг/мл 3 мл | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 5.4 | G04 Средства для лечения урологических заболеваний | | | | |
| 5.4. 1 | G04B Прочие средства для лечения урологических заболеваний, включая спазмолитические | Оксибутинин | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | | Силденафил | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | — | При легочной артериальной гипертензии. Назначается на основании заключения |

| | | | | | врачебного консилиума |
|-----------|---|--------------------------|--|---|---|
| 5.4. 2 | G04C Средства, применяемые при лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы | Тамсулозин | Таблетки пролонгированного действия 0,4 мг | Таблетки пролонгированного действия 0,4 мг | — |
| | | | Капсулы с модифицированным высвобождением (таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой) 0,4 мг | Капсулы с модифицированным высвобождением 0,4 мг | — |
| | | | Капсулы пролонгированного действия 0,4 мг | Капсулы пролонгированного действия 0,4 мг | — |
| | | Финастерид | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — |
| | | Дутастерид | Капсулы 0,5 мг | Капсулы 0,5 мг | — |
| | | Сабаль мелкопильчатый | Капсулы 320 мг | Капсулы 320 мг | — |
| 6 | H Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины | | | | |
| 6.1 | H01 Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги | | | | |
| 6.1. 1 | H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | Соматропин | Раствор для подкожного введения 10 мг/1,5 мл | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|--|--|---|
| 6.1. 2 | H01B Гормоны задней доли гипофиза и их аналоги | Десмопрессин | Таблетки 0,1 мг | Таблетки 0,1 мг | Назначается на основании заклучения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки 0,2 мг | Таблетки 0,2 мг | |
| | | | Спрей назальный 10 мкг/доза | — | |
| 6.1. 3 | H01C Гормоны гипоталамуса | Октреотид | Раствор для инъекций 50 мкг/мл (для внутривенного и подкожного введения) 1 мл | Раствор для инъекций 50 мкг/мл 1 мл | Назначается на основании заклучения врачебного консилиума |
| | | | Раствор для инъекций 100 мкг/мл (для внутривенного и подкожного введения) 1 мл | Раствор для инъекций 100 мкг/мл 1 мл | |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг | — | |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг | — | |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг | — | |
| | | Ланреотид | Раствор для инъекций | — | Назначается на основании |

| | | | | | |
|------|---|------------------|---|---|--|
| | | | пролонгированно о высвобождения 60 мг | | заключения врачебного консилиума |
| | | | Раствор для инъекций пролонгированно о высвобождения 90 мг | — | |
| | | | Раствор для инъекций пролонгированно о высвобождения 120 мг | — | |
| 6.2 | H02 Кортикостероиды для системного применения | | | | |
| 6.2. | H02A 1 Кортикостероиды для системного применения | Бетаметазон | Суспензия для инъекций 5 мг + 2 мг/1 мл | Суспензия для инъекций 5 мг + 2 мг/1 мл | — |
| | | Флудрокортизон | Таблетки 0,1 мг | — | — |
| | | Гидрокортизон | Порошок для приготовления раствора для инъекций 100 мг | — | — |
| | | | Таблетки 20 мг | — | — |
| | | Дексаметазон | Таблетки 0,5 мг | — | — |
| | | | Раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл | — |
| | | | Раствор для инъекций 4 мг/мл 2 мл | Раствор для инъекций 4 мг/мл 2 мл | — |
| | | Метилпреднизолон | Суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл | — | — |
| | | | Стерильный порошок (лиофилизат) для | — | — |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|---|
| | | приготовления раствора для инъекций 125 мг | | |
| | | Стерильный порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг | — | — |
| | | Стерильный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 500 мг | — | — |
| | | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | — | — |
| | | Таблетки 4 мг | — | — |
| | | Таблетки 8 мг | — | — |
| | | Таблетки 16 мг | — | — |
| | | Таблетки 32 мг | — | — |
| | | Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг | — | — |
| | Преднизолон | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 (25) мг/мл 1 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл | — |
| | | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | Триамцинолон | Суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл | — | — |
| | | Таблетки 4 мг | — | — |
| | Кортизон | Таблетки 25 мг | — | — |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|--|-------------------------------------|---|
| 6.3 | H03 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы | | | | |
| 6.3. 1 | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы | Левотироксин натрия | Таблетки 25 мкг | – | – |
| | | | Таблетки 50 мкг | Таблетки 50 мкг | – |
| | | | Таблетки 75 мкг | – | – |
| | | | Таблетки 100 мкг | Таблетки 100 мкг | – |
| | | | Таблетки 125 мкг | – | – |
| | | | Таблетки 150 мкг | – | – |
| 6.3. 2 | H03B Антитиреоидные средства | Тиамазол | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 5 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | – | – |
| 6.3. 3 | H03C Средства на основе йода | Калия йодид | Таблетки 100 мкг | Таблетки 100 мкг | – |
| | | | Таблетки 200 мкг | Таблетки 200 мкг | – |
| 6.4. | H05 Средства, регулирующие обмен кальция: | | | | |
| 6.4. 1 | H05B Антагонисты гормонов паращитовидной железы | Цинакальцет | Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 30 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 90 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 90 мг | – |
| 6.5 | H04 Гормоны поджелудочной железы | | | | |
| 6.5. 1 | H04A Гормоны, | Глюкагон | Лиофилизат для приготовления | – | – |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| | расщепляющие гликоген | | раствора для инъекций 1 мг | | |
| 7 | J Антиинфекционные средства для системного применения | | | | |
| 7.1 | J01 Антибактериальные средства для системного применения | | | | |
| 7.1.1 | J01A 1 Тетрациклины | Доксициклин | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | – |
| 7.1.1 | J01B 2 Амфениколы | Хлорамфеникол | Таблетки 250 мг | – | – |
| | | | Таблетки 500 мг | Таблетки 500 мг | – |
| | | | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | – |
| 7.1.1 | J01C Бета-лактамы антибиотиков, пенициллины | Амоксициллин | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | – |
| | | | Капсулы 500 мг | Капсулы 500 мг | – |
| | | | Таблетки диспергируемые 125 мг | – | В детской практике |
| | | | Таблетки диспергируемые 250 мг | – | |
| | | | Таблетки диспергируемые 500 мг | – | |
| | | | Таблетки диспергируемые 1000 мг | – | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки), 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки), 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг | |
| | | Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки), 1000 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг | |
| | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 25 мг/мл | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл | |
| | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 50 мг/мл | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 50 мг/мл | |
| | Ампициллин | Таблетки 250 мг | Таблетки 250 мг | — |
| | | Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г | — | — |
| | | Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | — | — |
| | Бензатин бензилпенициллин/ Бензилпенициллин натрия/ Бензилпенициллин | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 600 000 ЕД | — | — |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | ин прокаин (БИЦИЛЛИН-3) | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1 200 000 ЕД | — | — |
| | Бензатин бензилпенициллин/ Бензилпенициллин новокаиновая соль (бензилпенициллин прокаин) (БИЦИЛЛИН-5) | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1 200 000 ЕД + 300 000 ЕД | — | — |
| | Бензилпенициллин | Порошок для приготовления раствора для инъекций 500 000 ЕД | — | — |
| | | Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (для инъекций) 1 000 000 ЕД | — | — |
| | Бензилпенициллин новокаиновая соль | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 600 000 ЕД | — | — |
| | Оксациллин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и | — | — |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|--------------------|
| | | | внутримышечного введения 500 мг | | |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг | — | — |
| | | Амоксициллин/Клавулановая кислота | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 500 мг/100 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/100 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 1000 мг/200 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг/200 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (25 мг + 6,25 мг)/мл | — | В детской практике |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (40 мг + 5,7 мг)/мл | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (40 мг + 5,7 мг)/мл | |

| | | | | | |
|------|--------------------------|------------|---|---|---|
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (50 мг + 12,5 мг)/мл | – | |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (80 мг + 11,4 мг)/мл | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (80 мг + 11,4 мг)/мл | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг | – |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (120 мг + 8,58 мг)/мл | – | В детской практике. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 7.1. | J01D Прочие бета-лактамы | Цефалексин | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | – |
| 4 | антибиотики | | Капсулы 500 мг | Капсулы 500 мг | – |

| | | | | | |
|--|--|------------|--|--|---|
| | | Цефазолин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечного введения) 500 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечного введения) 500 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечного введения) 1000 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечного введения) 1000 мг | — |
| | | Цефуроксим | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 250 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | — |

| | | | | | |
|--|--|------------|--|---|---|
| | | | введения (для инъекций) 750 мг | ного введения 750 мг | |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1500 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1500 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | — |
| | | | Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл | Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл | — |
| | | Цефотаксим | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 500 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для | — |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | инъекций) 500 мг | |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1000 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1000 мг | — |
| | | Имипенем/Циластатин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 250 мг/250 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 250 мг/250 мг | При заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 500 мг/500 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 500 мг/500 мг | |
| | | | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 500 мг/500 мг | Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 500 мг/500 мг | |
| 7.1.5 | J01E Сульфаниламиды и триметоприм | Сульфаметоксазол/Триметоприм (ко-тримоксазол) | Таблетки 400 мг + 80 мг | Таблетки 400 мг + 80 мг | В детской практике, при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе, при |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|--|---|------------------------------|--|---|---|--|---|---|----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | первичных иммунодефицитах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Суспензия для приема внутрь | – | В детской практике | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | J01F | Азитромицин | Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг | – | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Макролиды, линкозамиды и стрептограмин ы | | | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | – | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | – | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | – | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Капсулы 500 мг | Капсулы 500 мг | – | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г | Порошок для приготовлени я суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г | – | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г | Порошок для приготовлени я суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г | – |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--------------------|
| | | | внутреннего применения 25 мг/мл 20 г | для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г | |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 40 мг/мл 24 г | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 40 мг/мл 24 г | — |
| | | Эритромицин | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг | — |
| | | Кларитромицин | Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл | — | В детской практике |
| | | | Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл | — | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | — |

| | | | | | |
|------|---|------------|--|---|--|
| | | | | оболочкой, 250 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | |
| | | | Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой (таблетки пролонгированног о действия, покрытые оболочкой), 500 мг | Таблетки с пролонгирова нным высвобождени ем, покрытые оболочкой, 500 мг | |
| | | Линкомицин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 300 мг/мл 1 мл | Раствор для внутривенног о и внутримышеч ного введения (для инъекций) 300 мг/мл 1 мл | — |
| | | | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | — |
| 7.1. | J01G 7 Аминогликози дные антибиотики | Амикацин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенног о и внутримышеч ного введения 250 мг/мл 2 мл | Для комплексного лечения мультирезистентног о туберкулеза |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 4 мл | Раствор для внутривенног о и внутримышеч ного введения | |

| | | | | | |
|-------|--|----------------|---|---|--|
| | | | | 250 мг/мл 4 мл | |
| | | Гентамицин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 40 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 40 мг/мл 2 мл | — |
| 7.1.8 | J01M Антибактериальные средства, производные хинолона | Моксифлоксацин | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза |
| | | | Раствор для инфузий 1,6 мг/мл 250 мл | Раствор для инфузий 1,6 мг/мл 250 мл | При лечении кистозного фиброза |
| | | Офлоксацин | Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл | Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл | При лечении кистозного фиброза |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | — |
| | | Ципрофлоксацин | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | — |
| | | | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | — |
| | | Левифлоксацин | Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл, 150 мл | Раствор для инфузий 5 | При лечении кистозного фиброза |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| | | | | мг/мл 100 мл, 150 мл | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | — |
| | | | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг | — |
| 7.1. | J01X Прочие антибактериальные средства | | | | |
| 9 | | | | | |
| 7.1. | J01XB | Колистин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и ингаляций 2 000 000 МЕ | Порошок для приготовлени я раствора для внутривенног о введения и ингаляций 2 000 000 МЕ | При лечении кистозного фиброза. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 9.1 | Полимиксины | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения по 1 000 000 ЕД | Порошок для приготовлени я раствора для внутривенног о введения по 1 000 000 ЕД | | |
| | | Порошок для приготовления раствора для ингаляций по 1 000 000 ЕД | Порошок для приготовлени я раствора для ингаляций по 1 000 000 ЕД | | |

| | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|---|
| 7.1. | J01XE | Нитрофурантоин | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| 9.2 | Производные нитрофурана | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| 7.1. | J01XX Прочие антибактериальные средства | Линезолид | Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл | Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл | Для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 9.3 | | | Раствор для инфузий 2 мг/мл 200 мл | Раствор для инфузий 2 мг/мл 200 мл | |
| | | | Раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл | Раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | |
| | | | Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения 20 мг/мл | Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения 20 мг/мл | |
| | | Нитроксолин | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | — | — |
| 7.2 | J02 Противогрибковые средства для системного применения | | | | |
| 7.2. | J02A | Кетоконазол | Таблетки 200 мг | Таблетки 200 мг | — |
| 1 | Противогрибковые средства для системного применения | Флуконазол | Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл | Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл | — |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------|---|--|---|
| | | | Капсулы 50 мг | Капсулы 50 мг | – |
| | | | Капсулы 150 мг | Капсулы 150 мг | – |
| | | Вориконазол | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | В детской практике. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | |
| | | Итраконазол | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | – |
| | | Изавуконазол | Капсулы, 100 мг | – | Назначается на основании заключения республиканского врачебного консилиума |
| 7.3 | J 04 Средства, активные в отношении микобактерий | | | | |
| 7.3.1 | J04A Средства для лечения туберкулеза | Натрия аминосалицилат | Порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь | – |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 4 г | – | – |
| | | Рифампицин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для | – |

| | | | | | |
|------|---|-------------|--|---|---|
| | | | внутривенного введения (для инъекций) 150 мг | внутривенного введения 150 мг | |
| | | | Капсулы 150 мг | Капсулы 150 мг | — |
| | | Циклосерин | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | — |
| | | Капреомицин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1000 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг | — |
| | | Изониазид | Раствор для инъекций 100 мг/мл 5 мл | Раствор для инъекций 100 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Таблетки 300 мг | Таблетки 300 мг | — |
| | | Пиразинамид | Таблетки 500 мг | — | — |
| | | Этамбутол | Таблетки 400 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | — |
| 7.4 | J05 Антивирусные средства для системного применения | | | | |
| 7.4. | J05A Антивирусные средства прямого действия | | | | |
| 1 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------|--|--|---|
| 7.4. 1.1 | J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды | Ацикловир | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 200 мг | Таблетки 200 мг | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 400 мг | Таблетки 400 мг | — |
| | | Валганцикловир | Таблетки, покрытые оболочкой, 450 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 450 мг | — |
| 7.4. 1.2 | J05AP Противовирусные препараты для лечения ВИЧ инфекции | Рибавирин | Капсулы 200 мг | Капсулы 200 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | — | — |
| | | Софосбувир | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | — |
| 7.4. 1.3 | J05AE Ингибиторы вирусных протеаз | Лопинавир/Ритонавир | Раствор для перорального применения (80 мг + 20 мг)/мл | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг/50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг/50 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг | — |
| | | Дарунавир | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | — |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | — |
| 7.4. 1.4 | J05AF Нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | Зидовудин | Раствор для приема внутрь 10 мг/мл 200 мл | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, (таблетки) 300 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | — |
| | | Ламивудин | Раствор для приема внутрь 5 мг/мл | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | — |
| | | | Раствор для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл | — | — |
| | | Абакавир | Раствор для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | — |
| | | Тенофовир дизопроксил | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | — |
| | | 7.4. 1.5 | J05AG Ненуклеозидн | Невирапин | Таблетки 200 мг |

| | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|
| | ые ингибиторы обратной транскриптазы | | Суспензия для приема внутрь 10 мг/мл 100 мл, 240 мл | – | – |
| | | Эфавиренц | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | – |
| 7.4. | J05AR | Зидовудин/Ламивудин | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг/150 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг/150 мг | – |
| 1.6 | Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | Тенофовир дизопроксил/Эмтрицитабин | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг/200 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг/200 мг | – |
| | | Тенофовир дизопроксил/Эмтрицитабин/Эфавиренц | Таблетки, покрытые оболочкой (300 мг/200 мг/600 мг) | Таблетки, покрытые оболочкой (300 мг/200 мг/600 мг) | – |
| 7.5 | J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | | |
| 7.5. | J06B | Иммуноглобулин человека нормальный | Раствор для внутримышечного введения 100 мг/мл 1,5 мл | – | – |
| 1 | Иммуноглобулины | | Раствор для инъекций 165 мг/мл 10 мл, 20 мл | – | – |
| | | | Раствор для подкожного введения 165 мг/мл во флаконах 6 мл, 10 мл, 12 мл, 20 мл, 24 мл, 48 мл | – | – |

| | | | | | |
|---------|---|---|---|--|---|
| | | Иммуноглобулин человека нормальный (для взрослых) | Порошок для внутривенного введения (г) | — | — |
| | | Иммуноглобулин человека нормальный (для детской практики) | Порошок для внутривенного введения (г) | — | — |
| 8 | L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства | | | | |
| 8.1 | L01 Противоопухолевые средства | | | | |
| 8.1.1 | L01A Алкилирующие агенты | | | | |
| 1 | | | | | |
| 8.1.1.1 | L01AA Аналоги азотистого иприта | Хлорамбуцил | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | — | — |
| | | Мелфалан | Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения 50 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | — | — |
| | | Циклофосфамид | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг | — |
| | | | Таблетки 50 мг | — | — |
| 8.1.1.2 | L01AB Алкилсульфонаты | Бусульфан | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | — | — |
| 8.1.1.3 | L01AD Производные | Ломустин | Капсулы 40 мг | — | — |

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|-------------|---|---|---|
| | нитрозомочевинны | | | | |
| 8.1.1.4 | L01AX Прочие алкилирующие средства | Темозоломид | Капсулы 20 мг | Капсулы 20 мг | — |
| | | | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | — |
| | | | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | — |
| | | Дакарбазин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг | — | — |
| | | | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг | — | — |
| 8.1.2 | L01B Антиметаболиты | | | | |
| 8.1.2.1 | L01BA Аналоги фолиевой кислоты | Метотрексат | Раствор для инъекций 10 мг/мл в преднаполненных шприцах 7,5 мг/0,75 мл, 10 мг/мл, 20 мг/2 мл, 15 мг/1,5 мл, 25 мг/2,5 мл | Раствор для инъекций в преднаполненных шприцах 10 мг/мл 0,75 мл, 1 мл, 1,5 мл, 2 мл | — |
| | | | Раствор для подкожного введения 50 мг/мл в шприце 7,5 мг/0,15 мл, 10 мг/0,2 мл, 12,5 мг/0,25 мл, 15 мг/0,3 мл, 17,5 мг/0,35 мл, 20 мг/0,4 мл, 22,5 мг/0,45 мл | — | — |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | мг/0,45 мл, 25 мг/0,5 мл, 27,5 мг/0,55 мл, 30 мг/0,6 мл | | |
| | | | Раствор для инъекций 10 мг/мл во флаконах 1 мл, 5 мл | Раствор для инъекций 10 мг/мл во флаконах 1 мл, 5 мл | — |
| | | | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг | — |
| | | | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг | — |
| | | | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 1000 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг | — |
| | | | Таблетки 2,5 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | — |

| | | | | | |
|------|----------------|---------------|---|---|---|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — |
| | | | Таблетки 5 мг | — | — |
| | | | Таблетки 10 мг | — | — |
| | | | Порошок* | — | — |
| 8.1. | L01BB | Меркаптопурин | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| 2.2 | Аналоги пурина | Кладрибин | Раствор для внутривенного введения (для инъекций) (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 5 мл | Раствор для внутривенного введения (для инъекций) (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного введения (для инъекций) (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 10 мл | Раствор для внутривенного введения (для инъекций) (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 1 мг/мл 10 мл | — |
| | | Флударабин | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 50 мг | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения | — |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|--------------|---|---|---|
| | | | | (для инъекций) 50 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| 8.1. 2.3 | L01BC Аналоги пириимидина | Капецитабин | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | — |
| | | Тегафур | Капсулы 400 мг | — | — |
| | | Флуороурацил | Раствор для внутрисосудистого введения 50 мг/мл 5 мл | — | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл 5 мл, 10 мл, 20 мл, 100 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл во флаконах 5 мл | — |
| | | Цитарабин | Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инъекций 100 мг | Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инъекций 100 мг | — |
| | | | Раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл | Раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для | Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для | — |

| | | | | | |
|---------|-------|--|---|--|---|
| | | | приготовления раствора для инъекций 1000 мг | приготовления раствора для инъекций 1000 мг | |
| | | Гемцитабин | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 200 мг | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 200 мг | — |
| | | | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий (для инъекций) 1000 мг | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 1000 мг | — |
| 8.1.3 | L01C | Алкалоиды растительного происхождения и прочие соединения природного происхождения | | | |
| 8.1.3.1 | L01CA | Винкристин | Раствор для внутривенного введения (для инъекций) 0,5 мг/мл 1 мл | Раствор для внутривенного введения 0,5 мг/мл 1 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного введения (для инъекций) 0,5 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного введения 0,5 мг/мл 2 мл | — |
| | | Винбластин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг | — | — |
| | | Винорельбин | Концентрат для приготовления | Концентрат для приготовления | — |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | | раствора для инфузий 10 мг/мл | я раствора для инфузий 10 мг/мл | |
| | | | Капсулы 20 мг | — | — |
| | | | Капсулы 30 мг | — | — |
| 8.1. 3.2 | L01CB Производные подофиллотоксина | Этопозид | Раствор для инъекций 20 мг/мл | — | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл | — | — |
| 8.1. 3.3 | L01CD Таксаны | Доцетаксел | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 2 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 4 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 4 мл | — |
| | | Паклитаксел | Концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 16,7 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 16,7 мл | — |
| | | | Концентрат для приготовления | Концентрат для | — |

| | | | | | |
|---------|--|--------------|---|---|---|
| | | | инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл | приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 5 мл | |
| 8.1.4 | L01D Цитотоксические антибиотики и родственные им соединения | | | | |
| 8.1.4.1 | L01DB Антрациклины и их аналоги или Антрациклины и родственные препараты | Доксорубицин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг | — |
| | | Идарубицин | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг | — | — |
| | | | Раствор для внутривенного введения 5 мг | — | — |
| | | Митоксантрон | Раствор для инъекций 2 мг/мл 5 мл | — | — |
| | | | Раствор для инъекций 2 мг/мл 10 мл | — | — |
| | | Эпирубицин | Концентрат для приготовления раствора для инъекций 2 мг/мл 5 мл | — | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инъекций 2 мг/мл 25 мл | — | — |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---|----------------|---|
| 8.1.4.2 | L01DC Прочие цитотоксические антибиотики Прочие противоопухолевые антибиотики | Блеомицин | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 15 ЕД | – | – |
| 8.1.5 | L01E Ингибиторы протеинкиназы | | | | |
| 8.1.5.1 | L01E Ингибиторы протеинкиназы | Иматиниб | Капсулы 100 мг, таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Капсулы 100 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Нилотиниб | Капсулы 200 мг | Капсулы 200 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Капсулы 150 мг | Капсулы 150 мг | |
| | | Траметиниб | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | – | |
| | | Эверолимус | Таблетки 5 мг | – | При лимфангиолейомиоматозе легких. При туберозном склерозе. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки 10 мг | | |
| Руксолитиниб | Таблетки 5 мг | – | | | |

| | | | | | |
|---------|---|---------------|--|--|---|
| | | | Таблетки 15 мг | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки 20 мг | – | |
| | | Акалабрутиниб | Капсулы, 100 мг | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, 100 мг | – | |
| 8.1.6 | L01F Противоопухолевые средства. Моноклональные антитела и конъюгаты антител – лекарственное средство | | | | |
| 8.1.6.1 | L01F Моноклональные антитела и конъюгаты антител – лекарственное средство | Ритуксимаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10 мл | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 30 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 30 мл | |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 50 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 50 мл | |
| | | Трастузумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для 150 мг | Лиофилизат для приготовления раствора для 150 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Лиофилизат для приготовления концентрата для | Лиофилизат для приготовления | |

| | | | | | |
|---------|--|-------------|---|--|---|
| | | | приготовления раствора для инфузий 440 мг | я концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг | |
| | | Бевацизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 16 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 16 мл | |
| 8.1.7 | L01X Прочие противоопухолевые средства | | | | |
| 8.1.7.1 | L01XA Соединения платины | Карбоплатин | Концентрат для приготовления раствора для инфузий (раствор для инфузий концентрированный) 10 мг/мл 5 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 15 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 15 мл | — |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 45 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 45 мл | — |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|--|---|---|
| | | | | инфузий 10 мг/мл 45 мл | |
| | | Оксалиплатин | Порошок лиофилизированный (лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 50 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 50 мг | — |
| | | | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 100 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 100 мг | — |
| 8.1. 7.2 | L01XB Метилгидразины | Прокарбазин | Капсулы 50 мг | — | — |
| 8.1. 7.3 | L01XX Прочие противоопухолевые средства | Эстрамустин | Капсулы 140 мг | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Гидроксикарбамид | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | — |
| | | | Капсулы 500 мг | Капсулы 500 мг | — |
| | | Аспарагиназа | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10 000 МЕ | — | — |
| | | Иринотекан | Концентрат для приготовления раствора для | Концентрат для приготовления раствора для | Назначается на основании заключения |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|---|
| | | инфузий 20 мг/мл 2 мл | инфузий 20 мг/мл 2 мл | врачебного консилиума |
| | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл | Концентрат для приготовлени я раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл | |
| | Третиноин | Капсулы 10 мг | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | Пегаспаргаза | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 750 МЕ/мл 5 мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | Бортезомиб | Лиофилизированн ый порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 3,5 мг | Лиофилизиро ванный порошок (лиофилизат) для приготовлени я раствора для внутривенног о и подкожного введения 3,5 мг | При трансплантации. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Лиофилизированн ый порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и подкожного введения 2 мг | Лиофилизиро ванный порошок для приготовлени я раствора для внутривенног о и | – |

| | | | | | |
|-------|---|-------------|--|--|---|
| | | | | подкожного введения 2 мг | |
| | | | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 3,5 мг | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 3,5 мг | — |
| | | Иксазомиб | Капсулы 2,3 мг | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Капсулы 3 мг | — | |
| | | | Капсулы 4 мг | — | |
| 8.2 | L02 Противоопухолевые гормональные средства | | | | |
| 8.2.1 | L02A Гормоны и родственные соединения L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | Трипторелин | Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,1 мг | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Раствор для подкожного введения 0,1 мг/мл 1 мл | — | |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия 3,75 мг | — | |
| | | | Порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для внутримышечного | — | |

| | | | | | |
|------|--|------------|---|--|----------------------------------|
| | | | введения пролонгированног о высвобождения 3,75 мг | | |
| | | | Порошок для приготовления суспензии пролонгированног о высвобождения для внутримышечных и подкожных инъекций 11,25 мг | – | |
| 8.2. | L02B | Тамоксифен | Таблетки 10 мг | – | – |
| 2 | Антагонисты гормонов и родственные соединения L02BA Антиэстрогены | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | – | – |
| 8.2. | L02BG | Анастрозол | Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг | – |
| 3 | Ингибиторы ароматазы | Летрозол | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | – |
| | | Эксеместан | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | – | – |
| 8.3 | L03 Иммуностимуляторы | | | | |
| 8.3. | L03A | Филграстим | Раствор для инъекций (для внутривенного и подкожного введения) 300 | Раствор для инъекций 300 мкг/мл (30 млн. МЕ/мл) | При первичных иммунодефицитах |
| 1 | Цитокины и иммуномодуля торы L03AA | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------------|--|---|---|
| | Колониестимулирующие факторы и их аналоги | | мкг/мл (30 млн. МЕ/мл) | | |
| | | Ленограстим | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 33,6 млн. МЕ | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Пегфилграстим | Раствор для подкожного введения 10 мг/мл в предварительно заполненном шприце 0,6 мл | – | При трансплантации. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 8.3. 2 | L03AB Интерфероны | Интерферон альфа-2б | Раствор для инъекций (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения) 3 000 000 МЕ | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Пегинтерферон альфа-2а | Раствор для подкожного введения 135 мкг/0,5 мл в шприц-тюбике | – | При трансплантации, при остром и хроническом вирусных гепатитах |
| | | | Раствор для подкожного введения 180 мкг/0,5 мл в шприц-тюбике | – | С детям до 18 лет. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Пегинтерферон альфа-2б | Лиофилизированный порошок для | – | При трансплантации, |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | приготовления раствора для инъекций 50 мкг/0,5 мл | | при остром и хроническом вирусных гепатитах С детям до 18 лет. |
| | | | Лиофилизат (лиофилизированный порошок) для приготовления раствора для инъекций (для подкожного введения) 80 мкг/0,5 мл | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Лиофилизат (лиофилизированный порошок) для приготовления раствора для инъекций (для подкожного введения) 100 мкг/0,5 мл | — | |
| | | | Лиофилизат (лиофилизированный порошок) для приготовления раствора для инъекций (для подкожного введения) 120 мкг/0,5 мл | — | |
| | | | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 150 мкг/0,5 мл | — | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------|---|---|---|
| 8.3. 3 | L03AC Интерлейкины | Интерлейкин-2 | Раствор для инфузий и подкожного введения 0,5 мг (500 000 МЕ) | — | — |
| | | | Раствор для инфузий и подкожного введения 1 мг (1 000 000 МЕ) | — | — |
| 8.3. 4 | L03AX Прочие цитокины и иммуномодуляторы | Вакцина БЦЖ | Лиофилизат для внутривенного введения 25 мг (30 мг) | — | — |
| | | Тимуса экстракт (тималин) | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг | — |
| 8.4 | L04 Иммунодепрессанты | | | | |
| 8.4. 1 | L04A Иммунодепрессанты | | | | |
| 8.4. 1.1 | L04AA Селективные иммунодепрессивные средства | Микофеноловая кислота | Капсулы 250 мг | Капсулы 250 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг | — | |
| | | | Таблетки, покрытые | — | |

| | | | | | |
|---------|---|-------------|---|--|---|
| | | | кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг | | |
| | | Лефлуномид | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | — |
| | | Эверолимус | Таблетки 0,25 мг | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки 0,75 мг | — | |
| 8.4.1.2 | L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | Адалимумаб | Раствор для инъекций (раствор для подкожного введения) 40 мг/0,8 мл в шприцах | Раствор для подкожного введения 40 мг/0,8 мл в шприцах | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 8.4.1.3 | L04AC Ингибиторы интерлейкина | Тоцилизумаб | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 4 мл | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 10 мл | — | |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 20 мл | — | |
| | | | Раствор для подкожного введения 162 мг/0,9 мл | — | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--|---|---|
| | | Левелимаб | Раствор для подкожного введения 180 мг/мл 0,9 мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Секукинумаб | Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мг | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Раствор для подкожного введения 150 мг/мл | – | |
| | | Нетакимаб | Раствор для подкожного введения 60 мг/мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 8.4. 1.4 | L04AD Ингибиторы кальциневрина | Такролимус | Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг/мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Капсулы 0,5 мг | Капсулы 0,5 мг | |
| | | | Капсулы пролонгированного действия 0,5 мг | Капсулы пролонгированного действия 0,5 мг | |
| | | | Капсулы 1 мг | Капсулы 1 мг | |
| | | | Капсулы пролонгированного действия 1 мг | Капсулы пролонгированного действия 1 мг | |
| | | | Капсулы 5 мг | Капсулы 5 мг | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|---|---|---|
| | | | Капсулы пролонгированного действия 5 мг | Капсулы пролонгированного действия 5 мг | |
| | | Циклоспорин | Капсулы 25 мг | – | – |
| | | | Капсулы 50 мг | – | – |
| | | | Капсулы 100 мг | – | – |
| | | | Раствор для внутреннего применения (раствор для приема внутрь) 100 мг/мл | – | – |
| 8.4.1.5 | L04AX Прочие иммунодепрессивные средства | Азатиоприн | Таблетки 50 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | – | – |
| | | Леналидомид | Капсулы 5 мг | Капсулы 5 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Капсулы 10 мг | Капсулы 10 мг | |
| Капсулы 15 мг | Капсулы 15 мг | | | | |
| Капсулы 25 мг | Капсулы 25 мг | | | | |
| 9 | M Костно-мышечная система | | | | |
| 9.1 | M01 Противовоспалительные и противоревматические средства | | | | |
| 9.1.1 | M01A1 Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства | Кеторолак | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечного введения, для инъекций) 30 мг/мл 1 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для внутримышечного введения) 30 мг/мл 1 мл | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые | – |

| | | | | | |
|--|--|------------|---|---|--------------------|
| | | | оболочкой, 10 мг | | |
| | | Диклофенак | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций) 25 мг/мл 3 мл | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций) 25 мг/мл 3 мл | — |
| | | | Суппозитории ректальные 50 мг | Суппозитории ректальные 50 мг | В детской практике |
| | | | Суппозитории ректальные 100 мг | Суппозитории ректальные 100 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 25 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 50 мг | — |
| | | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой (таблетки замедленного высвобождения, | — | — |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | таблетки ретард, покрытые оболочкой), 100 мг | | |
| | | Ацеклофенак | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | — |
| | | Мелоксикам | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 1,5 мл | Раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1,5 мл | — |
| | | | Таблетки 7,5 мг | Таблетки 7,5 мг | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 15 мг | Таблетки 15 мг | — |
| | | | Суппозитории ректальные 7,5 мг | Суппозитории ректальные 7,5 мг | — |
| | | | Суппозитории ректальные 15 мг | Суппозитории ректальные 15 мг | — |
| | | | Ибупрофен | Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл | Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл |
| | | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | — |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--|---|---|---|--|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | — | |
| | | | Капсулы 200 мг | Капсулы 200 мг | — | |
| | | | Капсулы 400 мг | Капсулы 400 мг | — | |
| | | Напроксен | Таблетки, покрытые оболочкой 550 мг | Таблетки, покрытые оболочкой 550 мг | — | |
| | | Нимесулид | Порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 100 мг в пакетах | Порошок (гранулы) для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 100 мг в пакетах | — | |
| | | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — | |
| | | Хондроитина сульфат | Раствор для внутримышечного введения 100 мг/мл | Раствор для внутримышечного введения 100 мг/мл | — | |
| 9.1. | М01С 2 | Базисные противоревматические средства | Пеницилламин | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | — | |
| | | | | Капсулы 250 мг | — | |
| 9.2 | М03 Миорелаксанты | | | | | |
| 9.2. | М03А 1 | Миорелаксанты | Ботулотоксин А | Порошок для приготовления | — | Для пациентов с мышечными дистониями и |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|---|---|---|---|
| | периферического действия | | раствора для инъекций 500 ЕД | | гемифасциальным спазмом. Назначается на основании заключения врачебного консилиума. | |
| 9.2.2 | М03В Миорелаксанты центрального действия | Баклофен | Таблетки 10 мг | — | — | |
| | | | Таблетки 25 мг | — | — | |
| | | Толперизон | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | — | — |
| | | Толперизон/Лидокаин | Раствор для инъекций (для внутримышечного введения) (100 мг + 2,5 мг)/мл 1 мл | Раствор для инъекций (для внутримышечного введения) (100 мг + 2,5 мг)/мл 1 мл | — | — |
| 9.3 | М04 Противоподагрические средства | | | | | |
| 9.3.1 | М04А Противоподагрические средства | Аллопуринол | Таблетки 100 мг | — | — | |
| | | | Таблетки 150 мг | — | — | |
| | | | Таблетки 200 мг | — | — | |
| | | | Таблетки 300 мг | — | — | |
| 9.4 | М05 Средства для лечения заболеваний костей | | | | | |
| 9.4.1 | М05В Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей | Алендроновая кислота | Таблетки 70 мг | Таблетки 70 мг | — | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 70 мг | — | — | |
| | | Золедоновая кислота | Порошок лиофилизированный | Порошок лиофилизированный | Назначается на основании | |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|----------------------|--|--|---|
| | | | ый для приготовления раствора для инфузий 4 мг | анный для приготовления раствора для инфузий 4 мг | заклучения врачебного консилиума |
| | | | Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инфузий 5 мг | Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инфузий 5 мг | |
| | | | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл | |
| | | | Раствор для инфузий 5 мг | Раствор для инфузий 5 мг | |
| | | Памидроновая кислота | Для инфузий 3 мг/мл 10 мл | – | При незавершенном остеогенезе. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Деносумаб | Раствор для подкожного введения 60 мг/мл | – | Для пациентов с высоким риском переломов. Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| 10 | N Нервная система | | | | |
| 10.1 | N01 Анестезирующие средства | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|--|---|---|
| 10.1 1 | N01B Средства для местной анестезии | Прокаин | Раствор для инъекций 2,5 мг/мл | Раствор для инъекций 2,5 мг/мл | — |
| | | | Раствор для инъекций 5 мг/мл | Раствор для инъекций 5 мг/мл | — |
| | | | Раствор для инъекций 10 мг/мл | Раствор для инъекций 10 мг/мл | — |
| | | Лидокаин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл, 5 мл, 10 мл | Раствор для инъекций 10 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл, 10 мл | Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, 10 мл | — |
| | | Ропивакаин | Раствор для инъекций 2 мг/мл 20 мл | — | — |
| | | | Раствор для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл | — | — |
| | | | Раствор для инъекций 10 мг/мл 10 мл | — | — |
| | | Артикаин/Эпинефрин | Раствор для инъекций (40 мг + 0,005 мг)/мл в картриджах 1,7 мл (1,8 мл), в ампулах 2 мл | Раствор для инъекций (40 мг + 0,005 мг)/мл в ампулах 2 мл | — |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|---|---|---|
| | | | Раствор для инъекций (40 мг + 0,006 мг)/мл в картриджах 1,7 мл (в ампулах 2 мл) | Раствор для инъекций (40 мг + 0,006 мг)/мл в ампулах 2 мл | — |
| | | | Раствор для инъекций (40 мг + 0,010 мг)/мл в картриджах 1,7 мл (1,8 мл) | — | — |
| | | | Раствор для инъекций (40 мг + 0,012 мг)/мл в картриджах 1,7 мл (в ампулах 2 мл) | — | — |
| 10.2 | N02 Анальгетики | | | | |
| 10.2 | N02A Опиоиды | Морфин | Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл | — |
| .1 | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — | |
| | | | Таблетки шипучие 20 мг | — | — |
| | | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 10 мг | — | — |
| | | | Таблетки с контролируемым высвобождением 10 мг | — | — |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 30 мг | — | — |
| | | Таблетки с контролируемым высвобождением 30 мг | — | — |
| | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60 мг | — | — |
| | | Таблетки с контролируемым высвобождением 60 мг | — | — |
| | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 100 мг | — | — |
| | | Таблетки с контролируемым высвобождением 100 мг | — | — |
| | | Раствор для эпидурального и интратекального введения 1 мг/мл 1 мл, 2 мл | Раствор для эпидурального и интратекального введения 1 мг/мл 1 мл, 2 мл | — |
| | | Капли (раствор) для приема внутрь | — | — |

| | | | | |
|-------------|---|---|---|---|
| Гидроморфон | Таблетки пролонгированного действия 8 мг | — | — | |
| | Таблетки пролонгированного действия 16 мг | — | — | |
| | Таблетки пролонгированного действия 32 мг | — | — | |
| | Капсулы с пролонгированным высвобождением 4 мг | — | — | |
| | Капсулы с пролонгированным высвобождением 8 мг | — | — | |
| | Капсулы с пролонгированным высвобождением 16 мг | — | — | |
| | Капсулы с пролонгированным высвобождением 24 мг | — | — | |
| | Тримеперидин | Раствор для внутримышечного и подкожного введения 20 мг/мл 1 мл | Раствор для внутримышечного и подкожного введения 20 мг/мл 1 мл | — |
| | | Раствор для инъекций 20 мг/мл 1 мл | — | — |
| | Фентанил | Раствор для внутривенного и внутримышечного | Раствор для внутривенного и | — |

| | | | | | |
|--|--|-------------|---|--|---|
| | | | введения 0,05 мг/мл 2 мл | внутримышечного введения 0,05 мг/мл 2 мл | |
| | | | Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 12,5 мкг/ч | – | – |
| | | | Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 25 мкг/ч | – | – |
| | | | Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 50 мкг/ч | – | – |
| | | | Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 75 мкг/ч | – | – |
| | | | Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 100 мкг/ч | – | – |
| | | Бупренорфин | Раствор для инъекций 0,3 мг/мл | – | – |
| | | Трамадол | Раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл | Раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл | – |
| | | | Раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл | |

| | | | | | |
|------------|---|--|--|---|--------------------|
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | | Капсулы 50 мг | — | — |
| 10.2 .2 | N02B Прочие анальгетики- антипиретики | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки 500 мг | Таблетки 500 мг | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 500 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл 2 мл | — |
| | | Метамизол натрия | Таблетки 500 мг | Таблетки 500 мг | — |
| | | | Парацетамол | Сироп 24 мг/мл 100 мл | — |
| | | Раствор для приема внутрь (сироп) 30 мг/мл 90 мл | | Раствор для приема внутрь 30 мг/мл 90 мл | |
| | | Суспензия для приема внутрь 24 мг/мл | | — | |
| | | Таблетки 200 мг | | Таблетки 200 мг | — |
| | | Таблетки 500 мг | | Таблетки 500 мг | — |
| | | Суппозитории ректальные 50 мг | | — | В детской практике |
| | | Суппозитории ректальные 80 мг | — | | |
| | | Суппозитории ректальные 100 мг | — | | |
| | | Суппозитории ректальные 125 мг | — | | |
| | | Суппозитории ректальные 150 мг | — | | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------|---|---|---|
| | | | Суппозитории ректальные 250 мг | – | |
| | | | Суппозитории ректальные 300 мг | – | |
| 10.3 | N03 Противозепилептические средства | | | | |
| 10.3 | N03A Противозепилептические средства | | | | |
| .1 | | | | | |
| 10.3 | N03AA | Бензобарбитал | Таблетки 100 мг | – | – |
| .1.1 | Барбитураты и их производные | Фенобарбитал | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | – |
| 10.3 | | N03AB | Фенитоин | Таблетки 100 мг | – |
| .1.2 | Производные гидантоина | | | | |
| 10.3 | N03AE | Клоназепам | Таблетки 0,5 мг | – | – |
| .1.3 | Производные бензодиазепин а | | Таблетки 2 мг | – | – |
| 10.3 | N03AF | Карбамазепин | Таблетки 200 мг | Таблетки 200 мг | – |
| .1.4 | Производные карбоксамида | | Таблетки ретард, покрытые оболочкой (пролонгированног о действия), 200 мг | – | – |
| | | | Таблетки ретард, покрытые оболочкой (пролонгированног о действия), 400 мг | – | – |
| | | Оскарбазепин | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | Таблетки, покрытые | – |

| | | | | | |
|------|------------------------------|------------------------|---|--|---|
| | | | | оболочкой, 300 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг | — |
| 10.3 | N03AG | Вальпроевая кислота | Сироп 57,64 мг/мл 150 мл | Сироп 57,64 мг/мл 150 мл | — |
| .1.5 | Производные жирных кислот | | Таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированны м высвобождением; таблетки, покрытые кишечнорастворим ой оболочкой, 200 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров анным высвобождени ем 200 мг | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированны м высвобождением; таблетки, покрытые кишечнорастворим ой оболочкой; таблетки пролонгированног о действия, покрытые оболочкой) 300 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, с модифициров анным высвобождени ем 300 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, с | Таблетки, покрытые оболочкой, с | — |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|--|---|-------------------|
| | | | модифицированны м высвобождением (пролонгированног о действия, покрытые оболочкой) 500 мг | модифициров анным высвобождени ем 500 мг | |
| | | | Гранулы пролонгированног о действия 100 мг | – | – |
| | | | Гранулы пролонгированног о действия 250 мг | – | – |
| | | | Гранулы пролонгированног о действия 500 мг | – | – |
| 10.3 | N03AX Прочие | Топирамат | Капсулы 25 мг | – | – |
| .1.6 | противоэпилеп тические средства | | Капсулы 50 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | – |
| | | | Ламотриджин | Таблетки (таблетки жевательные/раств оримые) 25 мг | Таблетки 25 мг |
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | – |
| | | | Таблетки (таблетки | Таблетки 100 мг | – |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | жевательные/растворимые) 100 мг | | |
| | | | Таблетки жевательные/диспергируемые 5 мг (в детской практике) | — | — |
| | | Леветирацетам | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг | |
| | | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг | — | |
| | | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 750 мг | — | |
| | | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1000 мг | — | |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------|---|-------------------|--|
| | | | Таблетки пролонгированног о действия, покрытые оболочкой, 1500 мг | — | |
| | | Габапентин | Капсулы 100 мг | — | — |
| | | | Капсулы 300 мг | Капсулы 300 мг | — |
| | | | Капсулы 400 мг | Капсулы 400 мг | — |
| | | Прегабалин | Капсулы 75 мг | — | При периферической и центральной нейропатической боли у взрослых. Назначается на основании заключения врачебного консилиума, за исключением пациентов на паллиативном лечении |
| | | | Капсулы 150 мг | — | |
| | | | Капсулы 300 мг | — | |
| 10.4 | N04 Противопаркинсонические средства | | | | |
| 10.4 | N04A .1 Антихолинергил ческие средства центрального действия | Тригексифениди | Таблетки 2 мг | — | — |
| 10.4 | N04B .2 Допаминергиче ские средства | Леводопа/Бенсер азид | Капсулы (капсулы с модифицированны м высвобождением 100 мг/25 мг | — | — |
| | | | Капсулы с пролонгированным | — | — |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | высвобождением 100 мг/25 мг | | |
| | | | Таблетки 200 мг/50 мг | – | – |
| | | | Таблетки 100 мг/25 мг | – | – |
| | | | Капсулы 200 мг/50 мг | – | – |
| | | Леводопа/Карбидопа | Таблетки 250 мг/25 мг | – | – |
| | | Леводопа/Карбидопа/Энтакапон | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг/37,5 мг/200 мг | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг/50 мг/200 мг | – | |
| | | Амантадин | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | – |
| | | Прамирпексол | Таблетки 0,25 мг | Таблетки 0,25 мг | – |
| | | | Таблетки 1 мг | Таблетки 1 мг | – |
| | | | Таблетки пролонгированного действия 0,375 мг | – | – |
| | | | Таблетки пролонгированного действия 0,75 мг | – | – |
| | | | Таблетки пролонгированного действия 1,5 мг | – | – |
| 10.5 | N05 Психолептические средства | | | | |

| | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|---|
| 10.5 | N05A Антипсихотические средства | | | | |
| .1 | | | | | |
| 10.5 | N05AA .1.1 Фенотиазины с алифатической боковой цепью | Хлорпромазин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 25 мг/мл 2 мл | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, (драже) 25 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, (драже) 50 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, (драже) 100 мг | — | — |
| 10.5 | N05AB .1.2 Фенотиазины с пиперазиновой структурой | Трифлуоперазин | Раствор (для внутримышечного введения) для инъекций 2 мг/мл 1 мл | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, (капсулы) 5 мг | — | — |
| | | Флуфеназин | Раствор для инъекций 25 мг/мл 1 мл | — | — |
| 10.5 | N05AC .1.3 Фенотиазины с пиперидиновой структурой | Перициазин | Капсулы 10 мг | — | — |
| | | | Раствор для приема внутрь 4 % 30 мл | — | — |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--|---|---|
| | | | Раствор для приема внутрь 40 мг/мл 125 мл | – | – |
| 10.5 .1.4 | N05AD Производные бутирофенона | Галоперидол | Раствор для внутримышечного введения (для инъекций) 5 мг/мл 1 мл | Раствор для внутримышечного введения 5 мг/мл 1 мл | – |
| | | | Раствор для внутримышечного введения масляный 50 мг/мл 1 мл | – | – |
| | | | Таблетки 1,5 мг | – | – |
| | | | Таблетки 5 мг | – | – |
| 10.5 .1.5 | N05AF Производные тиоксантена | Зуклопентиксол | Раствор для внутримышечного введения (масляный) 50 мг/мл 1 мл | – | – |
| | | | Раствор для внутримышечного введения (масляный) 200 мг/мл 1 мл | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | – | – |
| | | Хлорпротиксен | Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг | – |

| | | | | | |
|------|---|--------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | — |
| | | Флупентиксол | Раствор для внутримышечного введения (масляный) 20 мг/мл 1 мл | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,5 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — | — |
| 10.5 | N05AH | Клозапин | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| .1.6 | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксипины | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | Оланзапин | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | Арипипразол | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| | | | Таблетки 15 мг | Таблетки 15 мг | — |

| | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | Таблетки 30 мг | Таблетки 30 мг | — |
| | | | Таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг | — | — |
| | | | Таблетки, диспергируемые в полости рта, 15 мг | — | — |
| 10.5 | N05AL | Сульпирид | Раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл | — | — |
| .1.7 | Бензамиды | | Капсулы 50 мг | Капсулы 50 мг | — |
| | | | Таблетки 50 мг | — | — |
| | | | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | — |
| | | | Таблетки 100 мг | — | — |
| | | | Капсулы 200 мг | Капсулы 200 мг | — |
| | | | Таблетки 200 мг | — | — |
| 10.5 | N05AN | Литий | Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг | — | — |
| .1.8 | Литий | | Капсулы (лития полиуроната 67,5 мг) | Капсулы (лития полиуроната 67,5 мг) | — |
| 10.5 | N05AX | Рisperидон | Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 12,5 мг/мл 2 мл | — | — |
| .1.9 | Прочие антипсихотические средства | | Порошок для приготовления суспензии для | — | — |

| | | | | | |
|------|--|------------|--|---|---|
| | | | внутримышечного введения пролонгированного действия 18,75 мг/мл 2 мл | | |
| | | | Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) 1 мг/мл 30 мл | Раствор для внутреннего применения 1 мг/мл 30 мл | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | — |
| | | Карипразин | Капсулы 1,5 мг | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Капсулы 3 мг | | |
| | | | Капсулы 4,5 мг | | |
| | | | Капсулы 6 мг | | |
| 10.5 | N05B .2 Анксиолитические средства (транквилизаторы) | Диазепам | Таблетки 2 мг | — | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг | — | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Ректальный раствор 5 мг | — | — |

| | | | | | |
|------|----------------------------------|--------------|---|---|---|
| | | | Ректальный раствор 10 мг | – | |
| | | | Суппозитории ректальные 5 мг | – | |
| | | | Суппозитории ректальные 10 мг | – | |
| | | Тофизопам | Таблетки 50 мг | – | – |
| | | | Капсулы, 50 мг | Капсулы, 50 мг | |
| 10.5 | N05C | Нитразепам | Таблетки 5 мг | – | – |
| .3 | Снотворные и седативные средства | Зопиклон | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 7,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 7,5 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 3,75 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 3,75 мг | – |
| 10.6 | N06 Психоаналептические средства | | | | |
| 10.6 | N06A | Амитриптилин | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | – |
| .1 | Антидепрессанты | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл | – |
| | | Мапротилин | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | – |
| | | Флуоксетин | Капсулы 20 мг | – | – |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | Пароксетин | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | — |
| | | Эсциталопрам | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| 10.6 | N06B .2 Психостимуляторы и ноотропные средства | Винпоцетин | Раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл | Раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| | | Гидролизат пептидов головного мозга | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мл | — |
| | | | Раствор для инъекций 10 мл | — | — |
| | | Пирацетам | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 200 мг/мл 5 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл 5 мл | — |

| | | | | | |
|--------|---|--------------------|---|---|---|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | — |
| | | | Капсулы 400 мг | Капсулы 400 мг | — |
| | | Цитиколин | Раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл | Раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл | — |
| 10.6.3 | N06D Средства для лечения деменции N06DA Антихолинэстеразные средства | Донепезил | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | Мемантин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | — |
| 10.7 | N07 Другие средства для лечения заболеваний нервной системы | | | | |
| 10.7.1 | N07A Парасимпатомиметические средства | Неостигмин | Раствор для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл | — | — |
| | | Пиридостигмин | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 60 мг | — | — |
| 10.7.2 | N07AX Прочие парасимпатомиметики | Холина альфосцерат | Раствор для внутривенного и внутримышечного | Раствор для внутривенного и | — |

| | | | | | |
|--------|---|------------|--|--|---|
| | метические средства | | введения (для инъекций) 250 мг/мл 4 мл | внутримышечного введения (для инъекций) 250 мг/мл 4 мл | |
| | | | Капсулы 400 мг | Капсулы 400 мг | — |
| | | | Капсулы 600 мг | Капсулы 600 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 600 мг | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 600 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 400 мг | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 400 мг | — |
| | | | Раствор для приема внутрь 600 мг/7 мл | Раствор для приема внутрь 600 мг/7 мл | — |
| 10.7.3 | N07C Средства для устранения головокружения | Циннаризин | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| | | Бетагистин | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 8 мг | Таблетки 8 мг | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 16 мг | Таблетки 16 мг | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 24 мг | Таблетки 24 мг | — |

| | | | | | |
|--------|--|---|--|--|---|
| | | | покрытые оболочкой) 24 мг | | |
| 10.7.4 | N07X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл | — |
| | | Глицин | Таблетки (таблетки подъязычные) 100 мг | Таблетки (таблетки подъязычные), 100 мг | — |
| 11 | Р Противопаразитарные средства | | | | |
| 11.1 | P01 Противопротозойные средства | | | | |
| 11.1.1 | P01A Противопротоzoйные средства. Производные нитроимидазола | Метронидазол | Таблетки 250 мг | Таблетки 250 мг | — |
| 11.1.2 | P01B Средства для лечения малярии | Гидроксихлорохин | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | — | — |
| 11.2 | P02 Антигельминтные средства | | | | |
| 11.2.1 | P02C Средства для лечения нематодозов | Мебендазол | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | Пирантел | Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл | Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл | — |
| | | | Таблетки (таблетки, | Таблетки 125 мг | — |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|
| | | | покрытые оболочкой) 125 мг | | |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг | Таблетки 250 мг | — |
| 12 | R Дыхательная система | | | | |
| 12.1 | R01 Средства для лечения заболеваний носа | | | | |
| 12.1.1 | R01A Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и другие средства для местного применения в ринологии | Мометазон | Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз | Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз | В детской практике |
| 12.2 | R02 Средства для лечения заболеваний гортани и глотки | | | | |
| 12.2.1 | R02A Средства для лечения заболеваний гортани и глотки | Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид/Феноксизтанол (мукосанин) | Раствор для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1000 мл | Раствор для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1000 мл | При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4 |
| 12.3 | R03 Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | |
| 12.3.1 | R03A Адренергические средства для ингаляционного применения | | | | |
| 12.3.1.1 | R03AC Селективные агонисты бета-2-адренорецепторов | Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций) 100 мкг/доза 200 доз, 400 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз, 400 доз | — |

| | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|---|---|
| | | Фенотерол | Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл | Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз | — |
| | | Формотерол | Порошок для ингаляций 12 мкг в капсулах | Порошок для ингаляций 12 мкг в капсулах | — |
| 12.3 | R03AK | Сальбутамол/Беклометазон | Аэрозоль ингаляционный дозированный (100 мкг + 50 мкг)/доза 200 доз | — | — |
| .1.2 | Адреномиметики в комбинации с кортикостероидами или другими средствами, за исключением холиноблокаторов | Сальметерол/Флутиказон | Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 50 мкг)/доза 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 50 мкг)/доза 120 доз | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 125 мкг)/доза 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 125 мкг)/доза 120 доз | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 250 мкг)/доза 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный (25 мкг + 250 мкг)/доза 120 доз | — |
| | | | Порошок для ингаляций (дозированный) | Порошок для ингаляций (50 мкг + 100 | — |

| | | | | | |
|------|---|-----------------------------|--|--|---|
| | | | (капсулы с порошком для ингаляций) (50 мкг + 100 мкг)/доза 60 доз | мкг)/доза 60 доз | |
| | | | Порошок для ингаляций (дозированный) (капсулы с порошком для ингаляций) (50 мкг + 250 мкг)/доза 60 доз | Порошок для ингаляций (50 мкг + 250 мкг)/доза 60 доз | — |
| | | | Порошок для ингаляций (дозированный) (капсулы с порошком для ингаляций) (50 мкг + 500 мкг)/доза 60 доз | Порошок для ингаляций (50 мкг + 500 мкг)/доза 60 доз | — |
| | | Формотерол/Беклометазон | Аэрозоль для ингаляций дозированный (6 мкг + 100 мкг)/доза 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный (6 мкг + 100 мкг)/доза 120 доз | — |
| 12.3 | R03AL | Фенотерол/Ипратропия бромид | Аэрозоль для ингаляций дозированный (50 мкг + 20 мкг)/доза 200 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный (50 мкг + 20 мкг)/доза 200 доз | — |
| .1.3 | Адреномиметики в комбинации с холиноблокаторами | | Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл | Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл | — |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|---|--------------------|
| 12.3 | R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных | | | | |
| .2 | заболеваний дыхательных путей | | | | |
| 12.3 .2.1 | R03BA Глюкокортикоиды | Беклометазон | Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 200 доз, 400 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 200 доз, 400 доз | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз, 400 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 200 доз, 400 доз | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 200 доз, 400 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 200 доз, 400 доз | — |
| | | Будесонид | Аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз | — | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный 200 мкг/доза 200 доз | — | — |
| | | | Суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл | — | В детской практике |
| | | | Суспензия для ингаляций 0,5 мг/мл 2 мл | — | |
| | | Флутиказон | Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз | — |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|--|--|---|
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз | — |
| 12.3 | R03BB | Ипратропия бромид | Аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг/доза 200 доз | — | — |
| .2.2 | Антихолинергические средства | | Раствор для ингаляций 250 мкг/мл | Раствор для ингаляций 250 мкг/мл | — |
| | | Тиотропия бромид | Раствор для ингаляций 2,5 мкг/ингаляционная доза в картридже 4,5 мл в комплекте с ингалятором Респимат | — | — |
| 12.3 | R03C | Сальбутамол | Сироп 0,4 мг/мл 125 мл | — | — |
| .3 | Адренергические средства для системного применения | | | | |
| 12.3 | R03D | Аминофиллин | Раствор для внутривенного введения 24 мг/мл 5 мл | Раствор для внутривенного введения 24 мг/мл 5 мл | — |
| .4 | Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний | | Таблетки 150 мг | Таблетки 150 мг | — |
| | | Теофиллин | Капсулы с модифицированными | — | — |

| | | | | | |
|--------|---|-------------|---|---|---|
| | дыхательных путей | | м высвобождением 100 мг | | |
| | | | Капсулы с модифицированным высвобождением 200 мг | — | — |
| | | | Капсулы с модифицированным высвобождением 300 мг | — | — |
| | | Монтелукаст | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | | Таблетки жевательные 4 мг | Таблетки жевательные 4 мг | — |
| | | | Таблетки жевательные 5 мг | Таблетки жевательные 5 мг | — |
| 12.4 | R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | | | | |
| 12.4.1 | R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами | Амброксол | Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл | Раствор для внутреннего применения и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл | — |
| | | | Раствор для приема внутрь (сироп) 3 мг/мл 100 мл, 150 мл | Раствор для приема внутрь (сироп) 3 мг/мл 100 мл, 150 мл | — |
| | | | Раствор для приема внутрь (сироп) 6 мг/мл 100 мл, 150 мл | Раствор для приема внутрь (сироп) 6 мг/мл 100 мл, 150 мл | — |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|--|--|---|
| | | | Таблетки 30 мг | Таблетки 30 мг | — |
| | | Ацетилцистеин | Раствор для ингаляций 200 мг/мл 5 мл | Раствор для ингаляций 200 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл 3 мл | — | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 600 мг | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 600 мг | — |
| | | | Дорназа альфа | Раствор для ингаляций, ампулы 2,5 мг/2,5 мг | — |
| 12.5 | R06 Антигистаминные средства для системного применения | | | | |
| 12.5.1 | R06A Антигистамин | Дифенгидрамин | Раствор для внутривенного и | Раствор для внутривенног | — |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--|---|--|
| ные средства для общего применения | | внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 1 мл | о и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 1 мл | | |
| | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — | |
| | Клемастин | Раствор для инъекций 1 мг/мл 2 мл | Раствор для инъекций 1 мг/мл 2 мл | — | |
| | Хлоропирамин | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — | |
| | | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | — | — | |
| | | Раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл | — | — | |
| | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 1 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл 1 мл | — | |
| | Цетиризин | Капсулы 5 мг | Капсулы 5 мг | — | |
| | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — | |
| | | Капсулы 10 мг | Капсулы 10 мг | — | |
| | Кетотифен | Таблетки 1 мг | Таблетки 1 мг | — | |
| | Лоратадин | Сироп 1 мг/мл 50 мл, 100 мл | Сироп 1 мг/мл 50 мл, 100 мл | — | |
| | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — | |
| | 12.6 | R07 Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы | | | |

| | | | | | |
|------|--|----------------|---|---|---|
| 12.6 | R07A Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы | Аммоний | Раствор для наружного применения 100 мг/мл 1 мл | Раствор для наружного применения 100 мг/мл 1 мл | — |
| 13 | S Средства для лечения заболеваний органов чувств | | | | |
| 13.1 | S01 Средства, применяемые в офтальмологии | | | | |
| 13.1 | S01A Противомикробные препараты | Тобрамицин | Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл | — | — |
| | | Ацикловир | Мазь глазная 30 мг/г | — | — |
| | | Сульфацетамид | Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл | — |
| | | Хлорамфеникол | Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 5 мл, 10 мл | Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 5 мл, 10 мл | — |
| | | Гентамицин | Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 1 мл, 5 мл | Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 1 мл, 5 мл | — |
| | | Ципрофлоксацин | Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл | — |
| | | Офлоксацин | Капли глазные 3 мг/мл 5 мл | — | — |

| | | | | | |
|------|--|---------------|--|--|---|
| | | | Мазь глазная 3 мг/г | – | – |
| | | Левифлоксацин | Раствор (капли глазные) 5 мг/мл 1 мл, 5 мл | Раствор (капли глазные) 5 мг/мл 1 мл, 5 мл | – |
| 13.1 | S01B .2 Противовоспалительные средства | Дексаметазон | Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл | – |
| | | Диклофенак | Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл | – |
| 13.1 | S01E Средства для лечения глаукомы и миотики .3 | | | | |
| 13.1 | S01EB .3.1 Парасимпатомиметики | Пилокарпин | Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл | – |
| 13.1 | S01EC .3.2 Ингибиторы карбоангидразы | Ацетазоламид | Таблетки 250 мг | – | – |
| | | Бринзоламид | Капли глазные (суспензия) 10 мг/мл 5 мл | Капли глазные (суспензия) 10 мг/мл 5 мл | – |
| | | Дорзоламид | Раствор (капли глазные) 20 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 20 мг/мл 5 мл | – |
| 13.1 | S01ED Бета-адреноблокаторы .3.3 | Тимолол | Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 1 мл | Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 1 мл | – |
| | | | Раствор (капли глазные) 5,0 мг/мл 1 мл | Раствор (капли | – |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------------------|--|--|---|
| | | | | глазные) 5,0 мг/мл 1 мл | |
| | | | Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Раствор (капли глазные) 5 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 5 мг/мл 5 мл | — |
| | | Бринзоламид/Тимолол | Суспензия (капли глазные) (10 мг + 5 мг)/мл 5 мл | Капли глазные (суспензия) (10 мг + 5 мг)/мл 5 мл | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Травопрост/Тимолол | Глазные капли, раствор (0,04 мг травопроста + 5 мг тимолола)/мл 2,5 мл | Глазные капли, раствор (0,04 мг травопроста + 5 мг тимолола)/мл 2,5 мл | — |
| | | Дорзоламид/Тимолол | Глазные капли, раствор 20 мг/мл/5 мг/мл 5 мл | Глазные капли, раствор 20 мг/мл/5 мг/мл 5 мл | — |
| | | Латанопрост/Тимолол | Капли глазные (раствор) (0,05 мг/5 мг)/мл | Капли глазные (раствор) (0,05 мг/5 мг)/мл | — |
| 13.1 | S01EE Аналоги | Латанопрост | Капли глазные (раствор) 50 мкг/мл, 2,5 мл | Капли глазные (раствор) 50 мкг/мл 2,5 мл | — |
| .3.4 | простагландин ов | Тафлупрост | Капли глазные (раствор) 15 мкг/мл 2,5 мл | — | — |

| | | | | | |
|--------|--|---|--|--|---|
| | | | Капли глазные (раствор) 15 мкг/мл 0,3 мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | Травопрост | Капли глазные (раствор) 40 мкг/мл 2,5 мл | Капли глазные (раствор) 40 мкг/мл 2,5 мл | – |
| 13.1.4 | S01F Мидриатические и циклоплегические средства | Атропин | Капли глазные 10 мг/мл 5 мл | – | – |
| 13.1.5 | S01G Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и противоаллергические средства | Кромоглицевоая кислота | Раствор (капли глазные) 20 мг/мл 10 мл | – | – |
| | | | Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл | – | – |
| 13.1.6 | S01X Прочие офтальмологические средства | Азапентацен | Раствор (капли глазные) 0,15 мг/мл 15 мл | – | – |
| | | 2-аминоэтансульфоновая кислота (таурин) | Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл, 10 мл | Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл, 10 мл | – |
| | | Цитохром С/Аденозин/Никотинамид | Капли глазные 10 мл | – | – |
| | | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) | Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл | – |

| | | | | | |
|--------|--|-------------------------------|--|--|--|
| | | | Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл | – |
| | | Декспантенол | Гель глазной 50 мг/г | – | При буллезном эпидермолизе, ихтиозе Q80.2–Q80.4 |
| | | Циклоспорин | Капли глазные, эмульсия 1 мг/мл в тубик-капельницах 0,3 мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума. Сухой синдром (Шегрена) |
| 13.2 | S02 Средства, применяемые в отолгии | | | | |
| 13.2.1 | S02D Прочие средства для лечения заболеваний в отолгии | Феназон/Лидокаина гидрохлорид | Капли ушные (40 мг/10 мг)/г 16 г, 20 г | Капли ушные (40 мг/10 мг)/г 16 г, 17,1 г, 20 г | В детской практике |
| 14 | V Различные лекарственные средства | | | | |
| 14.1 | V03 Прочие лекарственные средства | | | | |
| 14.1.1 | V03A Прочие лекарственные средства | Деферазирокс | Таблетки диспергируемые 250 мг | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки диспергируемые 500 мг | – | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 360 мг | – | |
| | | Кальция фолинат | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и | – |

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|---|--|--------------------------|
| | | | введения (для инъекций) 50 мг 10 мл | внутримышечного введения 50 мг 10 мл | |
| | | | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 100 мг 20 мл | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 100 мг 20 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 3 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 3 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 5 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 10 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг/мл 10 мл | — |
| | | Месна | Раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 4 мл | — | — |
| 14.1 | V03АН | Диазоксид | Капсулы 25 мг | — | Назначается на основании |
| .2. | Средства для | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | лечения гипогликемии | | | | заклучения врачебного консилиума |
| | | | Капсулы 100 мг | – | |
| ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАНАМ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЫДАВАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2025 г. № 823 «О ЛЬГОТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» | | | | | |
| № п/п | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтической-химической классификационной системы лекарственных средств | Международное непатентованное наименование лекарственного средства | Лекарственная форма, дозировка | Лекарственная форма отечественного производства, дозировка | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | А Пищеварительный тракт и обмен веществ | | | | |
| 15.1 | A02 Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности | | | | |
| 15.1.1 | A02A Антацидные средства | Алюминия фосфат | Суспензия | Суспензия | – |
| 15.1.2 | A02B Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной | Омепразол | Капсулы 10 мг (капсулы кишечнорастворимые) 10 мг | Капсулы кишечнорастворимые 10 мг | – |
| | | | Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг | Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг | – |

| | | | | | |
|------------|--|------------|--|--|---|
| | рефлюксной болезни | | | | |
| 15.2 | A03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | |
| 15.2 .1 | Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника | Дротаверин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенног о и внутримышеч ного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл | — |
| | | | Таблетки 40 мг | Таблетки 40 мг | — |
| | | | Таблетки 80 мг | — | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Силиконы | Капли для приема внутри 40 мг/мл 30 мл, 50 мл | Капли для приема внутри 40 мг/мл 30 мл, 50 мл | — |
| | | | Капли для приема внутри 66,66 мг/мл 30 мл | — | — |
| | | | Капли для внутреннего применения 300 мг/мл 30 мл | — | — |
| | | | Капли для приема внутри 100 мг/мл 50 мл | Капли для приема внутри 100 мг/мл 50 мл | — |
| | | | Капли для приема внутри 100 мг/мл 30 мл | Капли для приема внутри 100 мг/мл 30 мл | — |
| | | | | | |
| 15.2 .2 | A03F Прокинетики | Домперидон | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |

| | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 15.3 | A05 Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | |
| 15.3 | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей | Урсодезоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота | Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 100 мл | Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 100 мл | При гепатобилиарном заболевании ассоциированным с кистозным фиброзом |
| .1 | | | Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 250 мл | Суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 250 мл | |
| 15.4 | A06 Слабительные средства | | | | |
| 15.4 | A06A Слабительные средства | Лактулоза | Сироп 500–670 мг/мл 150 мл – 1000 мл, в пакетах 15 мл | Сироп 667–670 мг/мл 150 мл – 500 мл, в пакетах 15 мл | — |
| 15.5 | A07 Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника | | | | |
| 15.5 | A07A Противомикробные средства, действующие на кишечник | Нифуроксазид | Суспензия для внутреннего применения 44 мг/мл 90 мл | Суспензия для внутреннего применения 44 мг/мл 90 мл | — |
| .1 | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | — |
| | | | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | — |
| | | | Капсулы 200 мг | Капсулы 200 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Нистатин | Таблетки, покрытые | Таблетки, покрытые | — |

| | | | оболочкой, 500 000 ЕД | оболочкой, 500 000 ЕД | |
|------|---|--|--|--|---|
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 15.5 | A07B .2 Кишечные адсорбенты | Диосмектит | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 3000 мг | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 3000 мг | — |
| 15.5 | A07C .3 Электролиты с углеводами | Солевые комплексы для оральной регидратации | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения | — |
| 15.5 | A07E .4 Противовоспалительные средства, действующие на кишечник | Месалазин | Суппозитории ректальные 250 мг | Суппозитории ректальные 250 мг | — |
| | | | Суппозитории ректальные 500 мг | Суппозитории ректальные 500 мг | — |
| | | | Суспензия ректальная 4 г/60 мл во флаконах 60 мл | — | — |
| 15.5 | A07F .5 Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной | Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника | Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для | Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (порошок лиофилизированный для | — |

| | | | | | |
|------|--|--|---|--|---|
| | микрофлоры (пробиотики) | | приема внутрь) 5 доз | приготовления суспензии для приема внутрь) 5 доз | |
| 15.6 | A09 Средства, нормализующие пищеварение, в том числе ферментные средства | | | | |
| 15.6 | A09A .1 Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты | Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу | Капсулы кишечнорастворимые 10 000 ЕД | Капсулы кишечнорастворимые 10 000 ЕД | Для лечения кистозного фиброза |
| | | | Капсулы кишечнорастворимые, 25 000 ЕД | – | |
| | | | Капсулы 10 000 ЕД | – | При вращении рака желудка в головку поджелудочной железы; опухолевые поражения желудка и гепатопанкреатодуоденальной зоны с блоком Вирсунгова протока |
| | | | Капсулы 25 000 ЕД | – | |
| 15.7 | A11 Витамины | | | | |
| 15.7 | A11C .1 Витамины А и D и их комбинации | Холекальциферол | Капли (раствор для приема внутрь масляный) 0,5 мг/мл (20 000 МЕ/мл) 10 мл | Раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл | – |
| | | | Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл | Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл | |
| | | | Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл, 15 мл, 20 мл | Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл | |

| | | | | | |
|--------|--|-------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | 10 мл, 15 мл, 20 мл | |
| | | Кальцитриол | Капсулы 0,25 мкг | – | При гипопаратиреозе |
| | | | Раствор для приема внутрь масляный 1 мкг/мл | Раствор для приема внутрь масляный 1 мкг/мл | |
| 15.7.2 | A11D Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12 | Тиамин | Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 1 мл | Раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл 1 мл | – |
| 15.7.3 | A11H Прочие витамины (исключая комбинации) | Токоферол | Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 50 мг/мл 20 мл | – | – |
| | | | Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 100 мг/мл 20 мл | – | – |
| | | | Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) 300 мг/мл 20 мл | – | – |
| | | Пиридоксин | Раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл | – |
| | | | Таблетки, 50 мг | Таблетки, 50 мг | Для комплексного лечения туберкулеза |

| | | | | | |
|------------|--|---|---|---|-----------------------|
| | | | Порошок* (фармацевтическая субстанция для приготовления порошка) | – | При гомоцистинурии |
| 15.8 | A12 Минеральные добавки | | | | |
| 15.8 .1 | A12A Средства на основе кальция | Кальций/Холекальциферол | Капсулы 66,7 МЕ/166,7 мг | Капсулы 66,7 МЕ/166,7 мг | – |
| | | | Капсулы 133,4 МЕ/166,7 мг | Капсулы 133,4 МЕ/166,7 мг | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 15.8 .2 | A12C Прочие минеральные добавки | Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния | Таблетки 175 мг/175 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 140 мг/158 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 140 мг/158 мг | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 16 | B Кровь и кроветворные органы | | | | |
| 16.1 | B03 Противоанемические средства | | | | |
| 16.1 .1 | B03A Средства на основе железа | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс | Капли для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл | Капли для внутреннего применения 50 мг/мл | – |
| | | | Сироп 10 мг/мл | Сироп 10 мг/мл | – |
| 16.1 .2 | B03B Витамин B12 и фолиевая кислота | Цианокобаламин | Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл | – |
| | | | Фолиевая кислота | Таблетки 1 мг | Таблетки 1 мг |
| | | Порошок* | Порошок* | – | |
| 16.2 | B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы | | | | |
| 16.2 .1 | B05BA Растворы для парентерального питания | Глюкоза | Порошок (фармацевтическая субстанция для | – | – |

| | | | | | |
|------|--|-----------------|---|---|---|
| | | | приготовления порошка) | | |
| 16.3 | B06 Другие гематологические средства | | | | |
| 16.3 | B06A Прочие гематологические средства | Гиалуронидаза | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 мг | — |
| 17 | C Сердечно-сосудистая система | | | | |
| 17.1 | C01 Средства для лечения заболеваний сердца | | | | |
| 17.1 | C01A | Дигоксин | Таблетки 0,25 мг | Таблетки 0,25 мг | — |
| .1 | Сердечные гликозиды | | Порошок* | Порошок* | — |
| 17.1 | C01B | Амиодарон | Таблетки 200 мг | Таблетки 200 мг | — |
| .2 | Антиаритмические средства, классы I и III | | Порошок* | Порошок* | — |
| 17.2 | C03 Мочегонные средства | | | | |
| 17.2 | C03A | Гидрохлортиазид | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| .1 | Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 17.2 | C03C | Фуросемид | Таблетки 40 мг | Таблетки 40 мг | — |
| .2 | Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики) | | Порошок* | Порошок* | — |

| | | | | | |
|--------|---|---------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| 17.2.3 | C03D Калийсберегающие диуретики. Антагонисты альдостерона | Спиронолактон | Таблетки (покрытые оболочкой) 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | | Капсулы 25 мг | Капсулы 25 мг | — |
| | | | Капсулы 50 мг | Капсулы 50 мг | — |
| | | | Капсулы 100 мг | Капсулы 100 мг | — |
| | | | Таблетки (покрытые оболочкой) 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 17.3 | C07 Бета-адреноблокаторы | | | | |
| 17.3.1 | C07A Бета-адреноблокаторы | Пропранолол | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| | | | Таблетки 40 мг | Таблетки 40 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Соталол | Таблетки 80 мг | Таблетки 80 мг | — |
| | | | Таблетки 160 мг | Таблетки 160 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Атенолол | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Метопролол | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |

| | | | | | |
|------|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 17.4 | C08 Блокаторы кальциевых каналов | | | | |
| 17.4 | C08C .1 Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды. Производные дигидропиридина | Амлодипин | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 17.4 | C08D .2 Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце. Производные фенилалкиламина | Верапамил | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 17.5 | C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему | | | | |
| 17.5 | C09A .1 Ингибиторы ангиогензинпревращающего фермента. Ингибиторы ангиогензинпревращающего фермента | Каптоприл | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Эналаприл | Таблетки 2,5 мг | — | — |
| | | | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | — |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| | | | Таблетки 20 мг | Таблетки 20 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 18 | D Дерматологические средства | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 18.1 | D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи | | | | |
| 18.1 .1 | D01A Противогрибковые средства для местного применения. Производные имидазола и триазола | Клотримазол | Раствор для наружного применения 10 мг/мл | Раствор для наружного применения 10 мг/мл | — |
| | | | Крем (для наружного применения) 10 мг/г | — | — |
| | | Миконазол | Крем (для наружного применения) 20 мг/г | Крем для наружного применения 20 мг/г | — |
| 18.2 | D03 Средства для лечения ран и язв | | | | |
| 18.2 .1 | D03A Ранозаживляющие средства | Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови | Гель для наружного применения | Гель для наружного применения | При буллезном эпидермолизе |
| 18.3 | D06 Противомикробные средства для лечения заболеваний кожи | | | | |
| 18.3 .1 | D06A Антибиотики для местного применения | Гентамицин | Мазь для наружного применения 1 мг/г | Мазь для наружного применения 1 мг/г | — |
| | | D06B Химиотерапевтические средства для местного применения | Ацикловир | Мазь для наружного применения 25 мг/г | Мазь для наружного применения 25 мг/г |
| Мазь для наружного применения 50 мг/г | Мазь для наружного применения 50 мг/г | | | — | |
| 18.4 | D07 Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи | | | | |
| 18.4 .1 | | Гидрокортизон | Мазь для наружного | Мазь для наружного | — |

| | | | | | |
|--------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| | D07A Кортикостероиды | | применения 10 мг/г | применения 10 мг/г | |
| | | | Крем для наружного применения 1 мг/г | — | — |
| | | Бетаметазон | Мазь для наружного применения 0,5 мг/г | — | — |
| | | | Мазь (для наружного применения) 1 мг/г | Мазь для наружного применения 1 мг/г | — |
| | | | Крем для наружного применения 0,5 мг/г | — | — |
| | | | Крем 1 мг/г | — | — |
| | | | Мометазон | Крем для наружного применения 1 мг/г | — |
| | | Мазь 1 мг/г | — | — | |
| 18.4.2 | D07C Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками | Гидрокортизон/Окситетрациклин | Аэрозоль для применения на кожу, суспензия, (3,1 мг + 9,3 мг)/г в баллонах 32,25 г | — | При буллезном эпидермолизе |
| | | | Мазь (мазь для местного и наружного применения) (10 мг + 30 мг)/г | — | — |
| 18.5 | D08 Антисептические и дезинфицирующие средства | | | | |
| 18.5.1 | D08A Антисептические и | Хлоргексидин | Раствор для наружного (местного) | Раствор для наружного (местного) | — |

| | | | | | |
|------|---|-----------------------|--|---|---|
| | дезинфицирующие средства | | применения 0,5 мг/мл | применения 0,5 мг/мл | |
| | | Бриллиантовый зеленый | Раствор спиртовой для наружного применения 10 мг/мл | Раствор спиртовой для наружного применения 10 мг/мл | — |
| 19 | G Мочеполовая система и половые гормоны | | | | |
| 19.1 | G01 Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии | | | | |
| 19.1 | G01A | Фуразолидон | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | — |
| .1 | Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами | | Порошок* | Порошок* | — |
| 20 | H Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины | | | | |
| 20.1 | H02 Кортикостероиды для системного применения | | | | |
| 20.1 | H02A | Дексаметазон | Таблетки 0,5 мг | — | — |
| .1 | | | Кортикостероиды для системного применения. Глюкокортикоиды | Порошок* | — |
| | | Метилпреднизолон | Стерильный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 125 мг | — | — |
| | | | Стерильный порошок для приготовления | — | — |

| | | | | | |
|--------|--|-------------|--|--|---|
| | | | раствора для инъекций 250 мг | | |
| | | | Стерильный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для инъекций 500 мг | – | – |
| | | | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | – | – |
| | | | Таблетки 4 мг | – | – |
| | | | Таблетки 8 мг | – | – |
| | | | Таблетки 16 мг | – | – |
| | | | Таблетки 32 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг | – | – |
| | | | Порошок* | – | – |
| | | Преднизолон | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 (25) мг/мл 1 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл 1 мл | – |
| | | | Таблетки 5 мг | Таблетки 5 мг | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 20.2 | H03 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы | | | | |
| 20.2.1 | H03C Средства на основе йода | Калия йодид | Таблетки 100 мкг | Таблетки 100 мкг | – |
| | | | Таблетки 200 мкг | Таблетки 200 мкг | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 21 | J Антиинфекционные средства для системного применения | | | | |
| 21.1 | J01 Антибактериальные средства для системного применения | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|---|---|---|
| 21.1 .1 | J01C Бета- лактамы антибиотики, пенициллины | Амоксициллин | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 25 мг/мл | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл | — |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 50 мг/мл | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 50 мг/мл | — |
| | | | Таблетки диспергируемые 500 мг | — | — |
| | | | Таблетки диспергируемые 1000 мг | — | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|---|
| | | Ампициллин | Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г | — | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | — | — |
| | | Оксациллин | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг | — | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг | — | — |
| | | Амоксициллин/Клавулановая кислота | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (25 мг + 6,25 мг)/мл | — | — |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (40 мг + 5,7 мг)/мл | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (40 мг + 5,7 мг)/мл | — |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для | — | — |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|------------|---|--|---|
| | | | приема внутрь (для внутреннего применения) (50 мг + 12,5 мг)/мл | | |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) (80 мг + 11,4 мг)/мл | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (80 мг + 11,4 мг)/мл | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/125 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 875 мг/125 мг | – |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (120 мг + 8,58 мг)/мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 21.1 | J01D Прочие бета-лактамы антибиотики | Цефуроксим | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 250 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг | – |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 750 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 1500 мг | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1500 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг | — |
| | | | Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл | Гранулы (порошок) для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 21.1 .3 | J01E Сульфанилами | Сульфаметоксазол/ л/ | Таблетки 400 мг + 80 мг | Таблетки 400 мг + 80 мг | — |

| | | | | | |
|------|---|---------------------------------|---|---|---|
| | ды и триметоприм | Триметоприм (ко-тримоксазол) | Суспензия для приема внутрь | – | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 21.1 | J01F | Азитромицин | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г | Порошок для приготовлени я суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г | – |
| .4 | Макролиды, линкозамиды и стрептограмин ы | | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г | Порошок для приготовлени я суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г | – |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г | Порошок для приготовлени я суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г | – |
| | | | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 40 мг/мл | Порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри (для внутреннего применения) 40 мг/мл | – |
| | | Кларитромицин | Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 | – | – |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| | | | мг/мл (в детской практике) | | |
| | | | Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл (в детской практике) | – | – |
| 21.1 .5 | J01X Прочие антибактериальные средства | Нитрофурантоин | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | – |
| | | | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| | | Нитроксолин | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | – | – |
| | | | Порошок* | – | – |
| 21.2 | J02 Противогрибковые средства для системного применения | | | | |
| 21.2 .1 | J02A Противогрибковые средства для системного применения. Производные триазола | Флуконазол | Капсулы 50 мг | Капсулы 50 мг | – |
| | | | Капсулы 150 мг | Капсулы 150 мг | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| | | Изавуконазол | Капсулы, 100 мг | – | Назначается на основании заключения республиканского врачебного консилиума |
| 21.3 | J05 Антивирусные средства для системного применения | | | | |
| 21.3 .1 | J05A Антивирусные средства прямого действия | Ацикловир | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 200 мг | Таблетки 200 мг | – |
| | | | Таблетки (таблетки, | Таблетки 400 мг | – |

| | | | | | |
|------|---|-------------|--|---|---|
| | | | покрытые оболочкой) 400 мг | | |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 22 | L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства | | | | |
| 22.1 | L01B Противоопухолевые средства | | | | |
| 22.1 | L01BA | Метотрексат | Раствор для инъекций 10 мг/мл в преднаполненных шприцах 7,5 мг/0,75 мл, 10 мг/мл, 20 мг/2 мл, 15 мг/1,5 мл, 25 мг/2,5 мл | Раствор для инъекций в преднаполненных шприцах 10 мг/мл 0,75 мл, 1 мл, 1,5 мл, 2 мл | — |
| .1 | Антиметаболиты. Аналоги фолиевой кислоты | | Раствор для подкожного введения 50 мг/мл в шприце 7,5 мг/0,15 мл, 10 мг/0,2 мл, 12,5 мг/0,25 мл, 15 мг/0,3 мл, 17,5 мг/0,35 мл, 20 мг/0,4 мл, 22,5 мг/0,45 мл, 25 мг/0,5 мл, 27,5 мг/0,55 мл, 30 мг/0,6 мл | — | — |
| | | | Таблетки 2,5 мг | — | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | — |

| | | | | | |
|------|--|-------------|---|---|---|
| | | | Таблетки 10 мг | – | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 22.1 | L04AC | Тоцилизумаб | Раствор для подкожного введения 162 мг/0,9 мл | – | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| .2 | Ингибиторы интерлейкина | | | | |
| 23 | М Костно-мышечная система | | | | |
| 23.1 | M01 Противовоспалительные и противоревматические средства | | | | |
| 23.1 | M01A | Диклофенак | Суппозитории ректальные 50 мг | Суппозитории ректальные 50 мг | – |
| .1 | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства | | Суппозитории ректальные 100 мг | Суппозитории ректальные 100 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 25 мг | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 50 мг | – |
| | | | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой (таблетки | – | – |

| | | | | | |
|------|--|------------|---|---|---|
| | | | замедленного высвобождения, таблетки ретард, покрытые оболочкой) 100 мг | | |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Ибупрофен | Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл | Суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) 20 мг/мл | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | — |
| | | | Суппозитории ректальные 60 мг | Суппозитории ректальные 60 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 23.1 | M01C .2 Базисные противоревматические средства. Пеницилламин и его аналоги | | Пеницилламин | Таблетка, покрытые оболочкой, 250 мг | — |
| | | Порошок* | | — | — |
| 23.2 | M03 Миорелаксанты | | | | |
| 23.2 | M03В .1 Миорелаксанты центрального действия | Толперизон | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | — |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------|--|--|--|
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 23.3 | M05 Средства для лечения заболеваний костей | | | | |
| 23.3 | M05B .1 Средства, влияющие на структуру и минерализаци ю костей. Бисфосфонаты | Памидроновая кислота | Для инфузий 3 мг/мл 10 мл | — | При незавершенном остеогенезе. Назначается на основании заклучения врачебного консилиума |
| 24 | N Нервная система | | | | |
| 24.1 | N01 Анестезирующие средства | | | | |
| 24.1 | N01B Средства .1 для местной анестезии. Амиды | Лидокаин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 10 мг/мл 2 мл, 5 мл, 10 мл | Раствор для инъекций 10 мг/мл 5 мл | — |
| | | | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл, 10 мл | Раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, 10 мл | — |
| 24.2 | N02 Анальгетики | | | | |
| 24.2 | N02B Прочие .1 анальгетики- антипиретики. Анилиды | Парацетамол | Сироп 24 мг/мл 100 мл | — | — |
| | | | Раствор для приема внутрь (сироп) 30 мг/мл 90 мл | Раствор для приема внутрь 30 мг/мл 90 мл | — |
| | | | Таблетки 200 мг | Таблетки 200 мг | — |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------------|--|-----------------|---|
| | | | Таблетки 500 мг | Таблетки 500 мг | – |
| | | | Суппозитории ректальные 50 мг | – | – |
| | | | Суппозитории ректальные 80 мг | – | – |
| | | | Суппозитории ректальные 100 мг | – | – |
| | | | Суппозитории ректальные 125 мг | – | – |
| | | | Суппозитории ректальные 150 мг | – | – |
| | | | Суппозитории ректальные 250 мг | – | – |
| | | | Суппозитории ректальные 300 мг | – | – |
| | | | Суспензия для приема внутрь 24 мг/мл | – | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 24.3 | N03 Противозепилептические средства | | | | |
| 24.3 | N03A Противозепилептические средства. | | | | |
| .1 | | | | | |
| 24.3 | N03AA | Фенобарбитал | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | – |
| .1.1 | Барбитураты и их производные | | Порошок* | Порошок* | – |
| 24.3 | N03AF | Карбамазепин | Таблетки 200 мг | Таблетки 200 мг | – |
| .1.2 | Производные карбоксиамида | | Таблетки ретард, покрытые оболочкой (пролонгированного действия), 200 мг | – | – |
| | | | Таблетки ретард, покрытые оболочкой | – | – |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------------|---|---|---|
| | | | (продолгованног о действия), 400 мг | | |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 24.3 | N03AG | Вальпроевая кислота | Сироп 57,64 мг/мл 150 мл | Сироп 57,64 мг/мл 150 мл | – |
| .1.3 | Производные жирных кислот | | Гранулы продолгованног о действия 100 мг | – | – |
| | | | Гранулы продолгованног о действия 250 мг | – | – |
| | | | Гранулы продолгованног о действия 500 мг | – | – |
| 24.3 | N03AX Прочие | Топирамат | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | – |
| .1.4 | противоэпилеп тические средства | | Капсулы 25 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | – |
| | | | Капсулы 50 мг | – | – |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| | Ламотриджин | | Таблетки (таблетки жевательные/раств оримые) 25 мг | Таблетки 25 мг | – |
| | | | Таблетки 50 мг | Таблетки 50 мг | – |
| | | | Таблетки (таблетки | Таблетки 100 мг | – |

| | | | | | |
|------|--|-----------|--|---|---|
| | | | жевательные/растворимые) 100 мг | | |
| | | | Таблетки жевательные/диспергируемые 5 мг | – | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 24.4 | N05 Психолептические средства | | | | |
| 24.4 | N05B | Диазепам | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 5 мг/мл 2 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл | – |
| .1 | Анксиолитические средства (транквилизаторы). Производные бензодиазепина | | Таблетки 2 мг | – | – |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 5 мг | Таблетки 5 мг | – |
| | | | Таблетки 10 мг | – | – |
| | | | Ректальный раствор, 5 мг | – | – |
| | | | Ректальный раствор, 10 мг | – | – |
| | | | Суппозитории ректальные, 5 мг | – | – |
| | | | Суппозитории ректальные, 10 мг | – | – |
| | | | Порошок* | Порошок* | – |
| 24.5 | N06 Психоаналептические средства | | | | |
| 24.5 | N06B | Пирацетам | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 200 мг/мл 5 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл 5 мл | – |
| .1 | Психостимуляторы и ноотропные средства Прочие психостимуляторы | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|---|--|--|---|
| | оры и ноотропы | | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг | — |
| | | | Капсулы 400 мг | Капсулы 400 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 24.6 | N07 Другие средства для лечения заболеваний нервной системы | | | | |
| 24.6.1 | N07X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 30 мг/мл 5 мл, 10 мл | — |
| 25 | P Противопаразитарные средства | | | | |
| 25.1 | P01A Противопротозойные средства | Метронидазол | Таблетки 250 мг | Таблетки 250 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 25.2 | P02 Антигельминтные средства | | | | |
| 25.2.1 | P02C Средства для лечения нематодозов | Мебендазол | Таблетки 100 мг | Таблетки 100 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Альбендазол | Суспензия для приема внутрь 20 мг/мл 20 мл | — | — |
| | | Пирантел | Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл | Суспензия для внутреннего применения 50 мг/мл 20 мл | — |
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 125 мг | Таблетки 125 мг | — |

| | | | | | |
|------|---|----------------|--|--|---|
| | | | Таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг | Таблетки 250 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 26 | R Дыхательная система | | | | |
| 26.1 | R01 Средства для лечения заболеваний носа | | | | |
| 26.1 | R01A Средства для устранения воспалительног о отека (деконгестанты) и другие средства для местного применения в ринологии | Ксилометазолин | Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл | Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл | — |
| .1 | | | Капли назальные 1 мг/мл 10 мл | Капли назальные 1 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл | Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл | Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл | — |
| | | Нафазолин | Капли назальные (раствор, капли в нос) 0,5 мг/мл 10 мл | Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Капли назальные (раствор, капли в нос) 1 мг/мл 10 мл, 20 мл | Капли назальные (раствор, капли в нос) 1 мг/мл 10 мл, 20 мл | — |
| | | | Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл | Спрей назальный 1 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл | Спрей назальный 0,5 мг/мл 10 мл | — |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | Оксиметазолин | Капли назальные 0,1 мг/мл 10 мл | Капли назальные 0,1 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Капли назальные 0,25 мг/мл 10 мл | Капли назальные 0,25 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл | Капли назальные 0,5 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Спрей назальный (дозированный) 0,25 мг/мл 10 мл | Спрей назальный (дозированны й) 0,25 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Спрей назальный (дозированный) 0,5 мг/мл 25 мл | Спрей назальный (дозированны й) 0,5 мг/мл 25 мл | — |
| | | Мометазон | Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз | Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз | — |
| | | Флутиказон | Спрей назальный (дозированный) 50 мкг/доза 120 доз | — | — |
| 26.2 | R02 Средства для лечения заболеваний гортани и глотки | | | | |
| 26.2 | R02A Средства .1 для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептическ ие средства | Полигексаметиле нбигуанид гидрохлорид/Фе ноксиэтанол (мукосанин) | Раствор для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1000 мл | Раствор для наружного и местного применения 100 мл, 500 мл, 1000 мл | При буллезном эпидермолизе |
| 26.3 | R03 Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|--|---|
| 26.3 .1 | R03A Адренергические средства для ингаляционного применения. | | | | |
| 26.3 .1.1 | R03AC Селективные агонисты бета-2-адренорецепторов | Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций) 100 мкг/доза 400 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 400 доз | — |
| | | Фенотерол | Аэрозоль дозированный для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз | — | — |
| | | | Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл | Раствор для ингаляций 1 мг/мл 20 мл | — |
| 26.3 .1.2 | R03AL Адреномиметики в комбинации с холиноблокаторами | Фенотерол/Ипратропия бромид | Аэрозоль для ингаляций дозированный (50 мкг + 20 мкг)/доза 200 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный (50 мкг + 20 мкг)/доза 200 доз | — |
| | | | Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл | Раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл | — |
| 26.3 .2 | R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | |
| 26.3 .2.1 | R03BA Глюкокортикоиды | Будесонид | Аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза 200 доз | — | — |
| | | | Аэрозоль ингаляционный дозированный 200 мкг/доза 200 доз | — | — |
| | | | Суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл | — | — |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|--|--|---|
| | | | Суспензия для ингаляций 0,5 мг/мл 2 мл | — | — |
| | | Флутиказон | Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 50 мкг/доза 60 доз, 120 доз | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 125 мкг/доза 60 доз, 120 доз | — |
| | | | Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз | Аэрозоль для ингаляций дозированный 250 мкг/доза 60 доз, 120 доз | — |
| 26.3 | R03BB .2.2 Антихолинергические средства | Ипратропия бромид | Раствор для ингаляций 250 мкг/мл | Раствор для ингаляций 250 мкг/мл | — |
| 26.3 | R03C .3 Адренергические средства для системного применения | Сальбутамол | Сироп 0,4 мг/мл 125 мл | — | — |
| 26.3 | R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Ксантины | Аминофиллин | Таблетки 150 мг | Таблетки 150 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| 26.4 | R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | | | | |

| | | | | | |
|------|--|----------------|---|--|-------|
| 26.4 | R05C .1 Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами | Амброксол | Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл | Раствор для внутреннего применения и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл | — |
| | | | Сироп 3 мг/мл 150 мл | Сироп 3 мг/мл 150 мл | — |
| | | | Сироп 6 мг/мл 150 мл | Сироп 6 мг/мл 150 мл | — |
| | | | Таблетки 30 мг | Таблетки 30 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Ацетилцистеин | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 100 мг | — |
| | | | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) 200 мг | — |
| | | | Препараты на основе корня алтея | Сироп | Сироп |
| | | Таблетки 50 мг | | — | — |
| | | Порошок* | | Порошок* | — |
| 26.5 | R06 Антигистаминные средства для системного применения | | | | |
| 26.5 | R06A .1 Антигистаминные средства для общего применения | Хлоропирамин | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 1 мл | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл 1 мл | — |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|---|
| | | | Таблетки 25 мг | Таблетки 25 мг | — |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | — | — |
| | | | Раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл | — | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Цетиризин | Капли для приема внутрь (внутреннего применения) 10 мг/мл 20 мл | Капли для приема внутрь (внутреннего применения) 10 мг/мл 20 мл | — |
| | | Лоратадин | Сироп 1 мг/мл 100 мл | Сироп 1 мг/мл 100 мл | — |
| | | | Таблетки 10 мг | Таблетки 10 мг | — |
| | | | Порошок* | Порошок* | — |
| | | Хифенадин | Таблетки 10 мг | — | — |
| | | | Порошок* | — | — |
| 27 | S Средства для лечения заболеваний органов чувств | | | | |
| 27.1 | S01 Средства, применяемые в офтальмологии | | | | |
| 27.1 | S01A .1 Противомикробные препараты | Ацикловир | Мазь глазная 30 мг/г | — | — |
| | | Тобрамицин | Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 5 мл | — | — |
| | | Гентамицин | Раствор (капли глазные) 3 мг/мл 1 мл, 5 мл | Раствор (капли глазные) 3 мг/мл, 5 мл | — |
| | | Сульфацетамид | Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 200 мг/мл 5 мл | — |

| | | | | | |
|--------|--|---|--|--|---|
| | | | Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 300 мг/мл 5 мл | — |
| 27.1.2 | S01B Противовоспалительные средства | Дексаметазон | Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 1 мг/мл 5 мл | — |
| 27.1.3 | S01E Средства для лечения глаукомы и миотики. Ингибиторы карбоангидразы | Ацетазоламид | Таблетки 250 мг | — | — |
| | | | Порошок* | — | — |
| 27.1.4 | S01F Мидриатические и циклоплегические средства | Атропин | Капли глазные 10 мг/мл 5 мл | — | — |
| | | Тропикамид | Капли глазные (раствор) 5 мг/мл 10 мл | Капли глазные (раствор) 5 мг/мл 10 мл | — |
| | | | Капли глазные (раствор) 10 мг/мл 10 мл | Капли глазные (раствор) 10 мг/мл 10 мл | — |
| 27.1.5 | S01G Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и противоаллергические средства | Кромоглициевая кислота | Раствор (капли глазные) 20 мг/мл 10 мл | — | — |
| | | | Раствор (капли глазные) 40 мг/мл 5 мл | — | — |
| 27.1.6 | S01X Прочие офтальмологические средства | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) | Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл | Раствор (капли глазные) 10 мг/мл 5 мл | — |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|--|--|---|
| | | | Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл | Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл | — |
| 27.2 | S02 Средства, применяемые в отологии | | | | |
| 27.2 .1 | S02D Прочие средства для лечения заболеваний в отологии | Феназон/Лидокаина гидрохлорид | Капли ушные (40 мг/10 мг)/г 16 г, 20 г | Капли ушные (40 мг/10 мг)/г 16 г, 17,1 г, 20 г | — |
| 28 | V Различные лекарственные средства | | | | |
| 28.1 | V03 Прочие лекарственные средства | | | | |
| 28.1 .1 | V03A Прочие лекарственные средства | Деферазирокс | Таблетки диспергируемые 250 мг | — | Назначается на основании решения врачебного консилиума |
| | | | Таблетки диспергируемые 500 мг | — | |
| | | | Таблетки, покрытые оболочкой, 360 мг | — | |
| 28.1 .2 | V03АН Средства для лечения гипогликемии | Диазоксид | Капсулы 25 мг | — | Назначается на основании заключения врачебного консилиума |
| | | | Капсулы 100 мг | — | |
| 28.2 | V04 Диагностические средства | | | | |
| 28.2 .1 | V04С Прочие диагностические средства | Глюкоза | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (15 г) | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (15 г) | — |
| | | | | Порошок (фармацевтическая субстанция для приготовления порошка) | — |

* Лекарственная форма, которая может готовиться аптеками по рецепту врача из готовых лекарственных форм «таблетки», «капсулы» в случае отсутствия данных лекарственных форм в виде фармацевтических субстанций.

Таблица 2

| ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, НАЗНАЧАЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАНАМ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЫДАВАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2025 г. № 823 | | | |
|---|--|--------------------------|---|
| № п/п | Шифр по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра | Наименование заболевания | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтической-химической классификационной системы лекарственных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | A15–A19 | Туберкулез | Основные группы противотуберкулезных лекарственных средств: J01C Бета-лактамы антибиотики, пенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза) J01D Прочие бета-лактамы антибиотики (имипенем/циластатин (по решению врачебного консилиума при заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>J01G Аминогликозидные антибиотики</p> <p>J01M Антибактериальные средства, производные хинолона</p> <p>J01X Прочие антибактериальные средства (линезолид (по решению врачебного консилиума для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза)</p> <p>J04A Средства для лечения туберкулеза Лекарственные средства для коррекции нежелательных явлений противотуберкулезной химиотерапии при множественной (широкой) лекарственной устойчивости:</p> <p>A02B Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (фамотидин, омепразол)</p> <p>A03F Прокинетики (домперидон, метоклопрамид)</p> <p>A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты (ондансетрон)</p> <p>A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей (урсодезоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота)</p> <p>A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства (эссенциальные фосфолипиды, фосфолипиды + глицирризиновая кислота)</p> <p>A07D Средства, снижающие моторную функцию желудочно-кишечного тракта (лоперамид)</p> <p>A07F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики) (бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника (в детской практике, при заболевании туберкулезом с множественной (широкой) лекарственной устойчивостью)</p> <p>A11H Прочие витамины (исключая комбинации) (пиридоксин)</p> <p>A12C Прочие минеральные добавки. Средства на основе калия (комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния)</p> <p>A16A Прочие средства для лечения заболеваний</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ (тиоктовая кислота, адеметионин (при циррозе печени))</p> <p>C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики) (фуросемид)</p> <p>C03D Калийсберегающие диуретики (спиронолактон)</p> <p>C04A Периферические вазодилататоры (пентоксифиллин)</p> <p>H02A Кортикостероиды для системного применения (дексаметазон, преднизолон)</p> <p>H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы (левотироксин натрия)</p> <p>J02A Противогрибковые средства для системного применения (флуконазол, итраконазол)</p> <p>M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства (диклофенак, ибупрофен)</p> <p>M04A Противоподагрические средства (аллопуринол)</p> <p>N03A Противозептические средства (карбамазепин, вальпроевая кислота)</p> <p>N05A Антипсихотические средства (галоперидол, рисперидон)</p> <p>N06A Антидепрессанты (амитриптилин, пароксетин, флуоксетин)</p> <p>N06B Психостимуляторы и ноотропные средства (винпоцетин, пирацетам)</p> <p>N07X Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы (глицин)</p> <p>R03A Адренергические средства для ингаляционного применения (сальбутамол)</p> <p>R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (флутиказон, ипратропия бромид)</p> <p>R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (амброксол, ацетилцистеин)</p> <p>R06A Антигистаминные средства для системного применения (клемастин, лоратадин)</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| 2 | A42.2 | Шейно-лицевой актиномикоз | J02A Противогрибковые средства для системного применения |
| 3 | B17.1 | Острый вирусный гепатит С (дети до 18 лет) | J05A Антивирусные средства прямого действия L03AB Интерфероны |
| 4 | B18.2 | Хронический вирусный гепатит С (дети до 18 лет) | J05A Антивирусные средства прямого действия L03AB Интерфероны |
| 5 | B20–B24 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | A16A Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ (адеметионин (при циррозе печени) J01E Сульфаниламиды и триметоприм (сульфаметоксазол/триметоприм (ко-тримоксазол) (при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе) J05A Антивирусные средства прямого действия |
| 6 | B34.2, B97.2 | Инфекция COVID-19 | N02B Прочие анальгетики-антипиретики (парацетамол) R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (ацетилцистеин) |
| 7 | B44 | Аспергиллез | J02A Противогрибковые средства для системного применения» (по решению республиканского врачебного консилиума) |
| 8 | C00–C97 | Злокачественные новообразования | A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты H02A Кортикостероиды для системного применения H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы H05B. Прочие антипаратиреоидные средства (цинакальцет, при карциноме паращитовидных желез и первичном гиперпаратиреозе) L01A Алкилирующие агенты L01B Антиметаболиты (C91.0 Острый лимфобластный лейкоз) L01C Алкалоиды растительного происхождения и |

| | | | |
|----|-----------------|--|--|
| | | | прочие соединения природного происхождения L01D Цитотоксические антибиотики и родственные им соединения L01E Прочие ингибиторы протеинкиназы L01X Прочие противоопухолевые средства L02A Гормоны и родственные соединения L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения. Ингибиторы ферментов L03A Цитокины и иммуномодуляторы L04A Иммунодепрессанты M01C Базисные противоревматические средства N02A Опиоиды N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| 9 | D45 | Полицитемия истинная | L01X Прочие противоопухолевые средства L03A Цитокины и иммуномодуляторы |
| 10 | D46 | Миелодиспластический синдром | B02B Витамин К и другие гемостатики H02A Кортикостероиды для системного применения L01X Прочие противоопухолевые средства L03A Цитокины и иммуномодуляторы L04A Иммунодепрессанты V03A Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума)) |
| 11 | D47 | Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | B01A Анти тромботические средства B02B Витамин К и другие гемостатики H02A Кортикостероиды для системного применения L01X Прочие противоопухолевые средства L03A Цитокины и иммуномодуляторы L04A Иммунодепрессанты N02A Опиоиды N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| 12 | D 48.7, J 84.81 | Лимфангиолейомиоматоз легких | L01E Ингибиторы протеинкиназы (эверолимус (по решению врачебного консилиума)) |
| 13 | D58.0–D58.1 | Другие наследственные гемолитические анемии | H02A Кортикостероиды для системного применения V03A Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума)) |

| | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| 14 | D59 | Приобретенная гемолитическая анемия | H02A Кортикостероиды для системного применения V03A Прочие лекарственные средства (деферазинокс (по решению врачебного консилиума)) |
| 15 | D60–D61 | Апластические и другие анемии | B02B Витамин К и другие гемостатики V03X Прочие противоанемические средства H02A Кортикостероиды для системного применения L01X Прочие противоопухолевые средства L03A Цитокины и иммуномодуляторы L04A Иммунодепрессанты V03A Прочие лекарственные средства (деферазинокс (по решению врачебного консилиума)) |
| 16 | D66 | Наследственный дефицит фактора VIII | B02B Витамин К и другие гемостатики H02A Кортикостероиды для системного применения |
| 17 | D67 | Наследственный дефицит фактора IX | B02B Витамин К и другие гемостатики H02A Кортикостероиды для системного применения |
| 18 | D68.0–D68.3 | Другие нарушения свертываемости | H02A Кортикостероиды для системного применения |
| 19 | D69.3 | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура | H02A Кортикостероиды для системного применения G03X Другие половые гормоны и модуляторы половой системы L03A Цитокины и иммуномодуляторы |
| 20 | D71, D80–D84, G11.3, Q87.8 | Первичные иммунодефициты | B06A Препараты, используемые при наследственном ангионевротическом отеке (C1-ингибитор (человеческий) (при наследственном ангионевротическом отеке по решению врачебного консилиума) G03X Другие половые гормоны и модуляторы половой системы H02A Кортикостероиды для системного применения (метилпреднизолон) J01A Тетрациклины (доксциклин) J01C Бета-лактамы антибиотики, пенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота) J01D Прочие бета-лактамы антибиотики (цефалексин) J01E Сульфаниламиды и триметоприм |

| | | | |
|----|----------------------|---|---|
| | | | <p>(сульфаметоксазол/триметоприм (котримоксазол) J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограминны (азитромицин) J01M Антибактериальные препараты – производные хинолона (офлоксацин) J02A Противогрибковые средства для системного применения (флуконазол, вориконазол (в детской практике по решению врачебного консилиума) J05A Антивирусные средства прямого действия (ацикловир) J06B Иммуноглобулины (иммуноглобулин человека нормальный) L03A Цитокины и иммуномодуляторы (филграстим (при первичных иммунодефицитах), для внутривенного введения)</p> |
| 21 | D 76, D 76.1, D 76.3 | <p>Другие уточненные заболевания с вовлечением лимфоретикулярно й ткани и ретикулогистиоцит арной системы: семейные гемофагоцитарные лимфогистиоцитоз ы; семейные гемофагоцитарные лимфогистиоцитоз ы с гипопигментацией: синдром Чедиака – Хигаши, синдром Грисцелли тип 2, синдром Германского – Пудлака типы 2, 10; Гемофагоцитарны</p> | <p>L01E Ингибиторы протеинкиназы (руксолитиниб (по решению врачебного консилиума)</p> |

| | | | |
|----|----------------------------------|--|--|
| | | й лимфогистиоцитоз ; другие гистиоцитозные синдромы | |
| 22 | D89.8 | Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированн ые в других рубриках (антифосфолипидн ый синдром) | V01A Антитромботические средства |
| 23 | E03.0–E03.1 | Врожденный гипотиреоз | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы |
| 24 | E03.4 | Атрофия щитовидной железы (приобретенная) | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы |
| 25 | E03.8, E89.0 | Другие уточненные гипотиреозы | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы |
| 26 | E10–E14, P70.2, 024, E89.1 | Сахарный диабет | A10A Инсулины и их аналоги A10B Пероральные гипогликемизирующие средства (вилдаглиптин, дапаглифлозин (при хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек (по решению врачебного консилиума), эмпаглифлозин (при хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек (по решению врачебного консилиума) H04A Гормоны, расщепляющие гликоген |
| 27 | E 16.1 | Другие формы гипогликемии (гиперинсулинизм) | V03АН Препараты для лечения гипогликемии (диазоксид (по решению врачебного консилиума) |

| | | | |
|----|--------------|---|--|
| 28 | E20, E89.2 | Гипопаратиреоз | A11C Витамины А и D и их комбинации. Витамин D и его аналоги A12A Средства на основе кальция |
| 29 | E21.1 | Вторичный гиперпаратиреоз | H05B Прочие антипаратиреодные средства (цинакальцет) |
| 30 | E22.0 | Акромегалия и гипофизарный гигантизм | H01C Гормоны гипоталамуса N04B Допамиnergические средства |
| 31 | E22.1 | Гиперпролактинемия | G02C Другие гинекологические средства N04B Допамиnergические средства |
| 32 | E22.8 | Другие состояния гиперфункции гипофиза | G02C Другие гинекологические средства L02A Гормоны и родственные соединения N04B Допамиnergические средства |
| 33 | E23.0, E89.3 | Гипопитуитаризм | G03B Андрогены G03C Эстрогены G03D Прогестагены G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции (до 18 лет) H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги H02A Кортикостероиды для системного применения H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы |
| 34 | E23.2 | Несахарный диабет | H01B Гормоны задней доли гипофиза и их аналоги |
| 35 | E24.0 | Болезнь Иценко-Кушинга | A12A Средства на основе кальция M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей |
| 36 | E25.0 | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | H02A Кортикостероиды для системного применения |
| 37 | E27.1, E27.4 | Недостаточность коры надпочечников | H02A Кортикостероиды для системного применения |

| | | | |
|----|-------|--|---|
| 38 | E43 | Тяжелая белково-энергетическая недостаточность | — |
| 39 | E70.1 | Фенилкетонурия | — |
| 40 | E70.2 | Нарушения обмена тирозина | — |
| 41 | E70.8 | Другие нарушения обмена ароматических аминокислот | — |
| 42 | E71.0 | Болезнь «кленового сиропа», или лейциноз | — |
| 43 | E71.1 | Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью | — |
| 44 | E71.3 | Нарушение обмена жирных кислот | — |
| 45 | E72.2 | Нарушения обмена серосодержащих аминокислот | — |
| 46 | E74.0 | Гликогенозы | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства B05B Растворы для внутривенного введения (глюкоза: раствор для инфузий, порошок (субстанция для приготовления порошка)) |
| 47 | E83.0 | Нарушения обмена меди | A12C Прочие минеральные добавки A12CB Средства на основе цинка (цинка сульфат (базисная терапия при непереносимости или отсутствии пенициллина) M01C Базисные противоревматические средства. Пеницилламин и его аналоги |

| | | | |
|----|--------|------------------------|--|
| | | | N04B Допаминергические средства. Производные адамантана |
| 48 | E 83.1 | Гемохроматоз | V03A Прочие лекарственные средства (деферазирокс (по решению врачебного консилиума)) |
| 49 | E84 | Кистозный фиброз | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей (урсодеоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота, при гепатобилиарном заболевании ассоциированным с муковисцидозом) A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты H02A Кортикостероиды для системного применения J01X Прочие антибактериальные средства (колистин (по решению врачебного консилиума при кистозном фиброзе)) R03A Адренергические средства для ингаляционного применения R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами (дорназа альфа, раствор для ингаляций, по решению врачебного консилиума) |
| 50 | F20 | Шизофрения | N04A Антихолинергические средства центрального действия N05A Антипсихотические средства N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы) N05C Снотворные и седативные средства N06A Антидепрессанты |
| 51 | F95.2 | Синдром де-ла-Туретта | N05A Антипсихотические средства |
| 52 | G10 | Болезнь Гентингтона | N05A Антипсихотические средства |
| 53 | G11 | Наследственная атаксия | N06B Психостимуляторы и ноотропные средства |
| 54 | G12.0 | Детская спинальная | N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства |

| | | | |
|----|-------|--|---|
| | | мышечная атрофия, I тип | |
| 55 | G12.2 | Болезнь двигательного нейрона | N07A Парасимпатомиметические средства |
| 56 | G20 | Болезнь Паркинсона | N04A Антихолинергические средства центрального действия N04B Допаминаргические средства |
| 57 | G21 | Вторичный паркинсонизм | C07A Бета-адреноблокаторы N04A Антихолинергические средства центрального действия N04B Допаминаргические средства |
| 58 | G23 | Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев | N04A Антихолинергические средства центрального действия N04B Допаминаргические средства |
| 59 | G24 | Дистония | M03A Миорелаксанты периферического действия (ботулотоксин А (по решению врачебного консилиума для пациентов с мышечными дистониями и гемифасциальным спазмом) M03B Миорелаксанты центрального действия N04B Допаминаргические средства N03A Противозепитические средства |
| 60 | G35 | Рассеянный склероз | H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты L01B Антиметаболиты. Аналоги пурина (кладрибин) L04A Иммунодепрессанты M03B Миорелаксанты центрального действия N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства |
| 61 | G37.3 | Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы | H02A Кортикостероиды для системного применения M03B Миорелаксанты центрального действия N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства |
| 62 | G40 | Эпилепсия | N03A Противозепитические средства |

| | | | |
|----|-------|--|--|
| 63 | G60 | Наследственная и идиопатическая невропатия | N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства |
| 64 | G61 | Воспалительная полиневропатия (первые 6 месяцев от начала заболевания) | H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты N07A Парасимпатомиметические средства |
| 65 | G70 | Миастения и другие нарушения нервно-мышечного синапса | H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты L04A Иммунодепрессанты N07A Парасимпатомиметические средства |
| 66 | G71.1 | Миотонические расстройства | N03A Противозепилептические средства S01E Средства для лечения глаукомы и миотики |
| 67 | G71.2 | Врожденные миопатии | A11H Прочие витамины (исключая комбинации) |
| 68 | G73 | Поражение нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках | H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты L04A Иммунодепрессанты N07A Парасимпатомиметические средства |
| 69 | G80 | Детский церебральный паралич | M03B Миорелаксанты центрального действия N06B Психостимуляторы и ноотропные средства |
| 70 | G90.3 | Полисистемная дегенерация | M03B Миорелаксанты центрального действия N04A Антихолинергические средства центрального действия N04B Допаминаргические средства |
| 71 | G95.0 | Сирингомиелия и сирингобульбия | N07A Парасимпатомиметические средства |
| 72 | H40 | Глаукома | S01E Средства для лечения глаукомы и миотики |
| 73 | I21 | Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от | V01A Антитромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | начала заболевания) | <p>C07A Бета-адреноблокаторы</p> <p>C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды</p> <p>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце</p> <p>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</p> <p>C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства</p> |
| 74 | I22 | Повторный инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от начала заболевания) | <p>V01A Антитромботические средства</p> <p>C01B Антиаритмические средства, класс III</p> <p>C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца</p> <p>C07A Бета-адреноблокаторы</p> <p>C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды</p> <p>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце</p> <p>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</p> <p>C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства</p> |
| 75 | I27.0–I27.2 | Легочная гипертензия | <p>S02K Прочие антигипертензивные средства (бозентан (по решению врачебного консилиума); риоцигуат (при легочной гипертензии (неоперабельная или персистирующая/рецидивирующая хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия) (по решению врачебного консилиума)</p> <p>G04B Прочие средства для лечения урологических заболеваний, включая спазмолитические (силденафил (при легочной артериальной гипертензии по решению врачебного консилиума)</p> |
| 76 | J45 | Астма | <p>H02A Кортикостероиды для системного применения</p> <p>R03A Адренергические средства для ингаляционного применения</p> <p>R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей</p> |

| | | | |
|----|---------|--|---|
| | | | R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
| 77 | I60–I64 | Цереброваскулярные болезни (первые 6 месяцев от начала заболевания) | B01A Антитромботические средства M03B Миорелаксанты центрального действия N02B Прочие анальгетики-антипиретики N06B Психостимуляторы и ноотропные средства N07A Парасимпатомиметические средства (холина альфосцерат) |
| 78 | K50 | Болезнь Крона | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин) |
| 79 | K51 | Язвенный колит | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин, циклоспорин) |
| 80 | K73.8 | Аутоиммунный гепатит | H02A Кортикостероиды для системного применения L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин) |
| 81 | K74.3 | Первичный билиарный цирроз | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей |
| 82 | K83.0 | Первичный склерозирующий холангит | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей |
| 83 | K91.2 | Нарушения всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированные в других рубриках | A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты B05B Растворы для парентерального питания B05X Добавки к растворам для внутривенного введения (при длительном смешанном (парентеральное + энтеральное) питании в амбулаторных условиях) |

| | | | |
|----|-------|---|--|
| 84 | L10.0 | Пузырчатка обыкновенная | D07A Кортикостероиды H02A Кортикостероиды для системного применения L04A Иммунодепрессанты (циклоспорин) |
| 85 | L10.4 | Пузырчатка эритематозная | D07A Кортикостероиды H02A Кортикостероиды для системного применения |
| 86 | L13.0 | Дерматит герпетиформный (болезнь Дюринга) | D07A Кортикостероиды H02A Кортикостероиды для системного применения |
| 87 | L40.1 | Генерализованный пустулезный псориаз | D05B Антипсориазные средства для системного применения. Ретиноиды для лечения псориаза L01B Антиметаболиты L04A Иммунодепрессанты (секукинумаб (по решению врачебного консилиума), нетакимаб (по решению врачебного консилиума)) |
| 88 | L40.5 | Псориаз артропатический | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник L01B Антиметаболиты L04A Иммунодепрессанты (лефлуномид, секукинумаб (по решению врачебного консилиума), нетакимаб (по решению врачебного консилиума), адалимумаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 89 | L40.8 | Другой псориаз | D07A Кортикостероиды H02A Кортикостероиды для системного применения M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 90 | M05 | Серопозитивный ревматоидный артрит | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты L04A Иммунодепрессанты (лефлуномид, левилимаб (по решению врачебного консилиума), тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума), адалимумаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства M01C Базисные противоревматические средства |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| 91 | M06 | Другие ревматоидные артриты | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L04A Иммунодепрессанты (лефлуномид, левилимаб (по решению врачебного консилиума), тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума), адалимумаб (по решению врачебного консилиума) L01B Антиметаболиты M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства M01C Базисные противоревматические средства |
| 92 | M08 | Юношеский (ювенильный) артрит | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты L04A Иммунодепрессанты (адалимумаб (по решению врачебного консилиума), тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства M01C Базисные противоревматические средства |
| 93 | M 08.2 | Юношеский артрит с системным началом | L04AC Ингибиторы интерлейкина (тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума) |
| 94 | M30.0 | Узелковый полиартериит | H02A Кортикостероиды для системного применения L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 95 | M30.1 | Полиартериит с поражением легких (Черджа-Стросса) | H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 96 | M31.3 | Гранулематоз Вегенера | H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) |

| | | | |
|-----|--------|--|---|
| | | | L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 97 | M31.5 | Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией | H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, тоцилизумаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 98 | M32 | Системная красная волчанка | H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) P01B Средства для лечения малярии (гидроксихлорохин) |
| 99 | M 33.0 | Юношеский дерматомиозит | L01B Антиметаболиты. Аналоги фолиевой кислоты (метотрексат) H02A Кортикостероиды для системного применения (метилпреднизолон) L01AA Аналоги азотистого иприта (циклофосфамид) |
| 100 | M33.2 | Полимиозит | L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) H02A Кортикостероиды для системного применения |
| 101 | M34 | Системный склероз | L01A Алкилирующие агенты L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Селективные иммунодепрессивные средства (микофеноловая кислота) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства M01C Базисные противоревматические средства |
| 102 | M35.0 | Сухой синдром (Шегрена) | H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты (хлорамбуцил) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |

| | | | |
|---------|-------------|---|--|
| | | | S01X Другие офтальмологические препараты (циклоспорин (по решению врачебного консилиума)) |
| 10 3 | M35.1 | Другие перекрестные синдромы | L01B Антиметаболиты (метотрексат) L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) H02A Кортикостероиды для системного применения M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 10 4 | M35.2 | Болезнь Бехчета | H02A Кортикостероиды для системного применения L01A Алкилирующие агенты L04A Иммунодепрессанты M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 10 5 | M35.3 | Ревматическая полимиалгия | H02A Кортикостероиды для системного применения L01B Антиметаболиты (метотрексат) |
| 10 6 | M45 | Анкилозирующий спондилит | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник L01B Антиметаболиты. Аналоги фолиевой кислоты L04A Иммунодепрессанты (адалимумаб (по решению врачебного консилиума), секукинумаб (по решению врачебного консилиума), нетакимаб (по решению врачебного консилиума)) M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| 10 7 | M80.4; 81.4 | Лекарственный остеопороз | M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей» (деносумаб (по решению врачебного консилиума)) |
| 10 8 | N04 | Нефротический синдром | L04A Иммунодепрессанты (микофеноловая кислота (по решению врачебного консилиума), такролимус (по решению врачебного консилиума), циклоспорин) |
| 10 9 | N18.0 | Терминальная стадия поражения почек | V05D Растворы для перитонеального диализа |
| 11 0 | O 99.1 | Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с | V01AB Прямые антикоагулянты на основе гепарина и его производных (дальтепарин, эноксапарин, надропарин (по решению врачебного консилиума)) |

| | | | |
|---------|-----------------------------|---|---|
| | | вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период | |
| 11 1 | Q78.0 | Незавершенный остеогенез | A11C Витамины А и D и их комбинации. Витамин D и его аналоги A12A Средства на основе кальция M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей. Бисфосфонаты |
| 11 2 | Q80.0–Q80.1; Q80.8 | Врожденный ихтиоз, простой ихтиоз, X-сцепленный ихтиоз, другой врожденный ихтиоз | A11H Прочие витамины D03A Ранозаживляющие средства |
| 11 3 | Q80.2 | Ламеллярный ихтиоз | A11H Прочие витамины D02A Смягчающие и защитные средства D03A Ранозаживляющие средства D08A Антисептические и дезинфицирующие средства S01X Прочие офтальмологические средства (декспантенол) |
| 11 4 | Q80.3–Q80.4 | Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия, ихтиоз плода («плод Арлекино») | A11H Прочие витамины D02A Смягчающие и защитные средства D03A Ранозаживляющие средства D06B Химиотерапевтические средства для наружного применения (сульфадиазин серебра) |
| 11 5 | Q81.0–Q81.2; Q81.8–Q81.9 | Буллезный эпидермолиз | A11H Прочие витамины (исключая комбинации) B06A Прочие гематологические средства D02A Смягчающие и защитные средства D06B Химиотерапевтические средства для местного применения (сульфадиазин серебра) |

| | | | |
|---------|--------|---|---|
| | | | D07A Кортикостероиды D08A Антисептические и дезинфицирующие средства H02A Кортикостероиды для системного применения R02AA Антисептические средства S01X Прочие офтальмологические средства (декспантенол) |
| 11 6 | Q 85.0 | Нейрофиброматоз, плексиформная нейрофиброма | L01E Ингибиторы протеинкиназы (траметиниб (по решению врачебного консилиума)) |
| 11 7 | Q 85.1 | Туберозный склероз | L01E Ингибиторы протеинкиназы (эверолимус (по решению врачебного консилиума)) |
| 11 8 | Q87.1 | Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью | H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги |
| 11 9 | Q96 | Синдром Тернера | G03C Эстрогены G03D Прогестагены H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги |
| 12 0 | Q98.0 | Синдром Клайнфелтера, кариотип 47, XXY | G03B Андрогены |
| 12 1 | Z94.0 | Наличие трансплантированной почки | H02A Кортикостероиды для системного применения J05A Антивирусные средства прямого действия L04A Иммунодепрессанты |
| 12 2 | Z94.1 | Наличие трансплантированного сердца | B01A Анти тромботические средства H02A Кортикостероиды для системного применения H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы J05A Антивирусные средства прямого действия L01X Прочие противоопухолевые средства L04A Иммунодепрессанты |
| 12 3 | Z94.4 | Наличие трансплантированной печени | H02A Кортикостероиды для системного применения J05A Антивирусные средства прямого действия L04A Иммунодепрессанты |

| | | | |
|---------|-------|--|--|
| 12 4 | Z95.1 | Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата (в течение 6 месяцев после операции) | V01A Антитромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| 12 5 | Z95.2 | Наличие протеза сердечного клапана | V01A Антитромботические средства |
| 12 6 | Z95.3 | Наличие ксеногенного сердечного клапана | V01A Антитромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| 12 7 | Z95.5 | Наличие коронарного ангиопластического имплантата и трансплантата (в течение 6 месяцев после операции) | V01A Антитромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце |

| | | | |
|---------|-------|---|--|
| | | | C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| 12 8 | Z95.8 | Наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов (в течение 6 месяцев после операции) | B01A Антитромботические средства C01B Антиаритмические средства, класс III C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца C07A Бета-адреноблокаторы C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства N02B Прочие анальгетики-антипиретики |

Таблица 3

| ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КАТЕГОРИЙ, А ТАКЖЕ В АПТЕКАХ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АПТЕК ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ) | | | | |
|--|--|---------------------|---|------------|
| № п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства или торговое наименование при отсутствии международного | Лекарственная форма | Лекарственная форма отечественного производства | Примечание |

| | непатентованного наименования | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Азитромицин | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения | В первую очередь, обязательна для наличия лекарственная форма отечественного производства и или производства государств – членов Евразийского экономического союза, а в случаях отсутствия лекарственной формы на рынке Республики Беларусь – лекарственная форма, произведенная за пределами государств – членов Евразийского экономического союза |
| 2 | Алюминия фосфат | Суспензия | Суспензия | |
| 3 | Амброксол | Раствор для внутреннего применения и ингаляций сироп таблетки | Раствор для внутреннего применения и ингаляций сироп таблетки | |
| 4 | Амиодарон | Таблетки | Таблетки | |
| 5 | Амлодипин | Таблетки | Таблетки | |
| 6 | Аммоний | Раствор для наружного применения | Раствор для наружного применения | |
| 7 | Амоксициллин | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения | |
| 8 | Амоксициллин/Клавулановая кислота | Таблетки, покрытые оболочкой порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | Таблетки, покрытые оболочкой порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | |
| 9 | Атенолол | Таблетки | Таблетки | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 10 | Аторвастатин | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 11 | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой |
| 12 | Ацетилцистеин | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) |
| 13 | Ацикловир | Мазь для наружного применения или крем, таблетки или таблетки, покрытые оболочкой | Мазь для наружного применения, таблетки |
| 14 | Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника | Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсулы, раствор | Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, раствор |
| 15 | Бетагистин | Таблетки | Таблетки |
| 16 | Бетаметазон | Мазь для наружного применения | Мазь для наружного применения |
| 17 | Бисакодил | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой |
| 18 | Бисопролол | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |

| | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 19 | Бриллиантовый зеленый | Раствор спиртовой для наружного применения | Раствор спиртовой для наружного применения |
| 20 | Валсартан | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 21 | Варфарин | Таблетки | Таблетки |
| 22 | Винпоцетин | Таблетки | Таблетки |
| 23 | Гентамицин | Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения | Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения |
| 24 | Гепарин | Гель для наружного применения или мазь для наружного применения | Гель для наружного применения или мазь для наружного применения |
| 25 | Гидрокортизон | Мазь для наружного применения | Мазь для наружного применения |
| 26 | Гидрохлортиазид | Таблетки | Таблетки |
| 27 | Глибенкламид | Таблетки | Таблетки |
| 28 | Гликлазид | Таблетки или таблетки с модифицированным высвобождением | Таблетки или таблетки с модифицированным высвобождением |
| 29 | Глицерил тринитрат | Таблетки подъязычные или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | Таблетки подъязычные |
| 30 | Дексаметазон | Раствор для инъекций, раствор (капли глазные) | Раствор для инъекций, раствор (капли глазные) |
| 31 | Диклофенак | Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой | Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой |

| | | | |
|----|------------|---|---|
| | | оболочкой), или капсулы пролонгированного действия, раствор (капли глазные) | (покрытые, кишечнорастворимой оболочкой), раствор (капли глазные) |
| 32 | Диосмектит | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) |
| 33 | Домперидон | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой |
| 34 | Дротаверин | Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций | Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 35 | Зопиклон | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 36 | Ибупрофен | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) |
| 37 | Индапамид | Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или капсулы | Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| | | | |
|----|----------------|---|--|
| 38 | Калия йодид | Таблетки | – |
| 39 | Каптоприл | Таблетки | Таблетки |
| 40 | Карведилол | Таблетки или капсулы | Таблетки или капсулы |
| 41 | Кеторолак | Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой | Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой |
| 42 | Кларитромицин | Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| 43 | Клопидогрел | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 44 | Клотримазол | Раствор для наружного применения или крем для наружного применения | Раствор для наружного применения |
| 45 | Ксилометазолин | Капли назальные или спрей назальный | Капли назальные или спрей назальный |
| 46 | Лактулоза | Сироп | Сироп |
| 47 | Лансопризол | Капсулы или капсулы кишечнорастворимые | Капсулы |
| 48 | Левифлоксацин | Таблетки, покрытые оболочкой, раствор (капли глазные) | Таблетки, покрытые оболочкой, раствор (капли глазные) |
| 49 | Лидокаин | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
| 50 | Лизиноприл | Таблетки | Таблетки |
| 51 | Лозартан | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 52 | Лоперамид | Капсулы или таблетки | Капсулы |
| 53 | Лоратадин | Таблетки | Таблетки |
| 54 | Мебендазол | Таблетки | Таблетки |

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 55 | Мелоксикам | Раствор для внутримышечного введения или раствор для инъекций, таблетки | Раствор для внутримышечного введения, таблетки |
| 56 | Метамизол натрия | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки |
| 57 | Метилурацил | Мазь для наружного применения | Мазь для наружного применения |
| 58 | Метоклопромид | Таблетки | Таблетки |
| 59 | Метопролол | Таблетки или таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением | Таблетки или капсулы с пролонгированным высвобождением |
| 60 | Метронидазол | Таблетки | Таблетки |
| 61 | Метформин | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой |
| 62 | Миконазол | Крем для наружного применения | Крем для наружного применения |
| 63 | Моксонидин | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 64 | Молсидомин | Таблетки | Таблетки |
| 65 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий или раствор для инъекций | Раствор для инфузий или раствор для инъекций |
| 66 | Нафазолин | Капли назальные или спрей назальный | Капли назальные или спрей назальный |
| 67 | Нимесулид | Таблетки или таблетки диспергируемые, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или | Таблетки, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего |

| | | | |
|----|----------------|---|--|
| | | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах | применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах |
| 68 | Нитрофурантоин | Таблетки | Таблетки |
| 69 | Нифуроксазид | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для внутреннего применения или суспензия для приема внутрь | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для приема внутрь |
| 70 | Ницерголин | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы |
| 71 | Оксиметазолин | Капли назальные или спрей назальный | Капли назальные или спрей назальный |
| 72 | Омепразол | Капсулы или капсулы кишечнорастворимые | Капсулы |
| 73 | Папаверин | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
| 74 | Парацетамол | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь | Таблетки, раствор для приема внутрь |
| 75 | Пентоксифиллин | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| 76 | Пирантел | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема | Таблетки, суспензия для внутреннего применения |

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| | | внутри или суспензия для перорального применения | |
| 77 | Пирацетам | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы |
| 78 | Преднизолон | Мазь для наружного применения или крем для наружного применения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки | Мазь для наружного применения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки |
| 79 | Прокаин | Раствор для инъекций | Раствор для инъекций |
| 80 | Пропранолол | Таблетки | Таблетки |
| 81 | Рамиприл | Таблетки | Таблетки |
| 82 | Розувастатин | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 83 | Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций) | Аэрозоль для ингаляций дозированный |
| 84 | Спиронолактон | Таблетки или капсулы | Таблетки или капсулы |
| 85 | Сульфадiazин серебра | Крем для наружного применения или мазь для наружного применения | Крем для наружного применения |
| 86 | Тербинафин | Крем для наружного применения или спрей для наружного применения или раствор для наружного применения | Крем для наружного применения или спрей для наружного применения, или раствор для наружного применения |
| 87 | Тимолол | Раствор (капли глазные) | Раствор (капли глазные) |
| 88 | Токоферол | Капли для внутреннего применения масляные | Капсулы |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | (раствор масляный) или капсулы | |
| 89 | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс | Таблетки жевательные | Таблетки жевательные |
| 90 | Триметазидин | Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки с модифицированным (пролонгированным) высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением | Таблетки, покрытые оболочкой или таблетки с модифицированным (пролонгированным) высвобождением, покрытые оболочкой |
| 91 | Урсодеоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота | Капсулы | Капсулы |
| 92 | Фамотидин | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 93 | Флуконазол | Капсулы | Капсулы |
| 94 | Флуоцинолон | Мазь для наружного применения или гель для наружного применения | Мазь для наружного применения или гель для наружного применения |
| 95 | Фолиевая кислота | Таблетки | Таблетки |
| 96 | Фуразолидон | Таблетки | Таблетки |
| 97 | Фуросемид | Таблетки | Таблетки |
| 98 | Хлорамфеникол | Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения | Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения |
| 99 | Хлоргексидин | Раствор для наружного (местного) применения | Раствор для наружного (местного) применения |

| | | | | |
|--|--|---|---|------------|
| 10 0 | Хондроитина сульфат | Раствор для внутримышечного введения | Раствор для внутримышечного введения | |
| 10 1 | Цетиризин | Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые оболочкой), или капсулы | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы | |
| 10 2 | Цефуроксим | Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, гранулы для приготовления суспензии для приема внутри | Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | |
| 10 3 | Циннаризин | Таблетки | Таблетки | |
| 10 4 | Ципрофлоксацин | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы | |
| 10 5 | Эналаприл | Таблетки | Таблетки | |
| 10 6 | Эссенциальные фосфолипиды | Капсулы | Капсулы | |
| 10 7 | Этамзилат | Таблетки | Таблетки | |
| ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ ТРЕТЬЕЙ И ПЯТОЙ КАТЕГОРИЙ, А ТАКЖЕ В АПТЕКАХ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ | | | | |
| № п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства или торговое наименование при отсутствии | Лекарственная форма | Лекарственная форма отечественного производства | Примечание |

| | международного непатентованного наименования | | | |
|---------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 8 | Алюминия фосфат | Суспензия | Суспензия | В первую очередь, обязательна для наличия лекарственная форма отечественного производства или производства государств – членов Евразийского экономического союза, а в случаях отсутствия лекарственной формы на рынке Республики Беларусь – лекарственная форма, произведенная за пределами государств – членов Евразийского экономического союза |
| 10 9 | Амброксол | Сироп, таблетки | Сироп, таблетки | |
| 11 0 | Амлодипин | Таблетки | Таблетки | |
| 11 1 | Аммоний | Раствор для наружного применения | Раствор для наружного применения | |
| 11 2 | Амоксициллин | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | Таблетки, покрытые оболочкой или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения | |
| 11 3 | Амоксициллин/Клавулановая кислота | Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | |
| 11 4 | Атенолол | Таблетки | Таблетки | |
| 11 5 | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой) или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимы | |

| | | | | |
|---------|-----------------------|---|---|--|
| | | | е, покрытые оболочкой | |
| 11 6 | Ацетилцистеин | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) | Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь) | |
| 11 7 | Ацикловир | Мазь для наружного применения, таблетки или таблетки, покрытые оболочкой | Мазь для наружного применения, таблетки | |
| 11 8 | Бетагистин | Таблетки | Таблетки | |
| 11 9 | Бетаметазон | Мазь для наружного применения | Мазь для наружного применения | |
| 12 0 | Бисакодил | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой | Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой | |
| 12 1 | Бисопролол | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой | |
| 12 2 | Бриллиантовый зеленый | Раствор спиртовой для наружного применения | Раствор спиртовой для наружного применения | |
| 12 3 | Винпоцетин | Таблетки | Таблетки | |
| 12 4 | Гентамицин | Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения | Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения | |
| 12 5 | Гепарин | Гель для наружного применения или мазь для наружного применения | Гель для наружного применения или мазь для наружного применения | |

| | | | |
|---------|--------------------|---|--|
| 12 6 | Гидрокортизон | Мазь для наружного применения | Мазь для наружного применения |
| 12 7 | Гидрохлортиазид | Таблетки | Таблетки |
| 12 8 | Глицерил тринитрат | Таблетки подъязычные или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | Таблетки подъязычные |
| 12 9 | Диклофенак | Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой) или капсулы пролонгированного действия, раствор (капли глазные) | Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), раствор (капли глазные) |
| 13 0 | Диосмектит | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) |
| 13 1 | Домперидон | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой |
| 13 2 | Дротаверин | Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций | Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 13 3 | Ибупрофен | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или |

| | | | |
|---------|----------------|--|--|
| | | приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) | порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения) |
| 13 4 | Индапамид | Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или капсулы | Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| 13 5 | Калия йодид | Таблетки | |
| 13 6 | Каптоприл | Таблетки | Таблетки |
| 13 7 | Карведилол | Таблетки или капсулы | Таблетки или капсулы |
| 13 8 | Кеторолак | Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой | Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой |
| 13 9 | Ксилометазолин | Капли назальные или спрей назальный | Капли назальные или спрей назальный |
| 14 0 | Лактулоза | Сироп | Сироп |
| 14 1 | Лансопризол | Капсулы или капсулы кишечнорастворимые | Капсулы |
| 14 2 | Лизиноприл | Таблетки | Таблетки |
| 14 3 | Лоперамид | Капсулы или таблетки | Капсулы |
| 14 4 | Лоратадин | Таблетки | Таблетки |
| 14 5 | Мебендазол | Таблетки | Таблетки |

| | | | |
|---------|------------------|---|---|
| 14 6 | Мелоксикам | Раствор для внутримышечного введения или раствор для инъекций, таблетки | Раствор для внутримышечного введения, таблетки |
| 14 7 | Метамизол натрия | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки |
| 14 8 | Метилурацил | Мазь для наружного применения | Мазь для наружного применения |
| 14 9 | Метопролол | Таблетки или таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением | Таблетки или капсулы с пролонгированным высвобождением |
| 15 0 | Метронидазол | Таблетки | Таблетки |
| 15 1 | Миконазол | Крем для наружного применения | Крем для наружного применения |
| 15 2 | Моксонидин | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 15 3 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий или раствор для инъекций | Раствор для инфузий или раствор для инъекций |
| 15 4 | Нафазолин | Капли назальные или спрей назальный | Капли назальные или спрей назальный |
| 15 5 | Нимесулид | Таблетки или таблетки диспергируемые, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах | Таблетки, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления |

| | | | |
|---------|----------------|--|--|
| | | | суспензии для приема внутрь в пакетах |
| 15 6 | Нитрофурантоин | Таблетки | Таблетки |
| 15 7 | Нифуроксазид | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для внутреннего применения или суспензия для приема внутрь | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для приема внутрь |
| 15 8 | Оксиметазолин | Капли назальные или спрей назальный | Капли назальные или спрей назальный |
| 15 9 | Омепразол | Капсулы или капсулы кишечнорастворимые | Капсулы |
| 16 0 | Парацетамол | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь | Таблетки, раствор для приема внутрь |
| 16 1 | Пентоксифиллин | Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| 16 2 | Пирантел | Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь или суспензия для перорального применения | Таблетки, суспензия для внутреннего применения |
| 16 3 | Пирацетам | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы |
| 16 4 | Преднизолон | Мазь для наружного применения или крем для наружного применения, | Мазь для наружного применения, раствор для внутривенного и |

| | | | |
|---------|---|---|--|
| | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки | внутримышечного введения, таблетки |
| 16 5 | Пропранолол | Таблетки | Таблетки |
| 16 6 | Рамиприл | Таблетки | Таблетки |
| 16 7 | Розувастатин | Таблетки, покрытые оболочкой | Таблетки, покрытые оболочкой |
| 16 8 | Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций) | Аэрозоль для ингаляций дозированный |
| 16 9 | Спиронолактон | Таблетки или капсулы | Таблетки или капсулы |
| 17 0 | Сульфадиазин серебра | Крем для наружного применения или мазь для наружного применения | Крем для наружного применения |
| 17 1 | Тербинафин | Крем для наружного применения или спрей для наружного применения или раствор для наружного применения | Крем для наружного применения или спрей для наружного применения, или раствор для наружного применения |
| 17 2 | Токоферол | Капсулы | Капсулы |
| 17 3 | Трехвалентного железа полимальтозный комплекс | Таблетки жевательные | Таблетки жевательные |
| 17 4 | Урсодеооксиhoлевая (урсодезоксидолевая) кислота | Капсулы | Капсулы |
| 17 5 | Флуконазол | Капсулы | Капсулы |

| | | | |
|---------|---------------------------|---|---|
| 17 6 | Флуоцинолона | Мазь для наружного применения или гель для наружного применения | Мазь для наружного применения или гель для наружного применения |
| 17 7 | Фолиевая кислота | Таблетки | Таблетки |
| 17 8 | Фуразолидон | Таблетки | Таблетки |
| 17 9 | Хлорамфеникол | Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения | Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения |
| 18 0 | Хлоргексидин | Раствор для наружного (местного) применения | Раствор для наружного (местного) применения |
| 18 1 | Цетиризин | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы | Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы |
| 18 2 | Циннаризин | Таблетки | Таблетки |
| 18 3 | Эналаприл | Таблетки | Таблетки |
| 18 4 | Эссенциальные фосфолипиды | Капсулы | Капсулы |
| 18 5 | Этамзилат | Таблетки | Таблетки |

Приложение 2
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
27.03.2026 № 23

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь

1. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65 «Об установлении перечня основных лекарственных средств».](#)
2. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 мая 2008 г. № 96 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
3. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 октября 2009 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
4. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г. № 128 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
5. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 25 «О внесении изменения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
6. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. № 81 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
7. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. № 25 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
8. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 августа 2018 г. № 65 «О внесении изменения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
9. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2019 г. № 64 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
10. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 ноября 2020 г. № 106 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
11. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 февраля 2023 г. № 34 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
12. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 апреля 2023 г. № 55 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)
13. [Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 июня 2024 г. № 96 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65».](#)